

Capitolo W35:
prontuario: integrali

Contenuti delle sezioni

- a. integrazione p.2
- b. antiderivate di integrandi algebrici p.3
- c. antiderivate di integrandi trascendenti p.15
- d. integrali definiti p.24

27 pagine



W35:a. integrazione

W35:a.01 schemi di integrazione

In questa sessione, salvo segnalazione contraria, assumiamo:

$a, b, c, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\eta \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ $f(x), g(x) \in \mathbf{FunRtR}$.

$$\int dx [g(x)]^\eta g'(x) = \frac{1}{b+1} [g(x)]^{\eta+1} + \mathbf{C} \quad , \quad \int dx \frac{g'(x)}{g(x)} = \ln |g(x)| + \mathbf{C}$$

$$\int dx \sin [g(x)] g'(x) = -\cos [g(x)] \quad , \quad \int dx \cos [g(x)] g'(x) = \sin [g(x)]$$

$$\int dx \frac{1}{\cos^2 [g(x)]} g'(x) = \tan [g(x)] + \mathbf{C} \quad , \quad \int dx \frac{1}{\sin^2 [g(x)]} g'(x) = \cot [g(x)] + \mathbf{C}$$

$$\int dx a^{g(x)} \cdot g'(x) = \frac{a^{g(x)}}{\ln a} + \mathbf{C}$$

W35:a.02 regole di integrazione

$$\int dx [\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \int dx f(x) + \beta \int dx g(x)$$

$$\int_a^c dx f(x) = \int_a^b dx f(x) + \int_b^c dx f(x)$$

W35.b. antiderivate di integrandi algebrici

W35.b.01 antiderivate di integrandi con $ax + b$

$$\int dx a = ax + C \quad \text{con } a \in \mathbb{R}$$

$$\int dx x^\alpha = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$\int dx \frac{1}{x} = \ln|x| + C, \quad \int dx \frac{1}{x^n} = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C$$

$$\int dx b^x = \frac{1}{\ln b} b^x + C \quad \text{con } b \in (0,1) \cup (1,+\infty) \quad \text{in partic. } \int dx e^x = e^x + C$$

$$\int dx (ax+b)^n = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} \quad \text{con } n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b|, \quad \int \frac{dx}{(ax+b)^n} = \frac{1}{n(n-1)(ax+b)^{n-1}} \quad \text{con } n \neq 1$$

$$\int dx x(ax+b)^n = \frac{1}{a^2} \left(\frac{(ax+b)^{n+2}}{n+2} - \frac{b(ax+b)^{n+1}}{n+1} \right) \quad \text{con } n \neq -1, -2$$

$$\int dx \frac{x}{ax+b} = \frac{x}{a} + \frac{b}{a^2} \ln|ax+b|$$

$$\int dx \frac{x}{(ax+b)^n} = \frac{1}{a^2} \left(\frac{b}{(n-1)(ax+b)^{n-1}} - \frac{1}{(n-2)(ax+b)^{n-2}} \right) \quad \text{con } n \neq 1$$

$$\int dx \frac{x^2}{ax+b} = \frac{x}{2a} + \frac{bx}{a^2} + \frac{b^2}{a^3} \ln|ax+b|$$

$$\int dx \frac{x^n}{ax+b} = \frac{x^n}{na} - \frac{bx^{n-1}}{(n-1)a^2} + \frac{b^2x^{n-2}}{(n-2)a^3} - \dots$$

$$+ (-1)^{n-1} \frac{b^{n-1}x}{a^n} + (-1)^{n-1} \frac{b^{n-1}}{a^n} \ln|ax+b| \quad \text{per } n = 3, 4, 5, \dots$$

$$\int dx \frac{x}{(ax+b)^2} = \frac{b}{a^2(ax+b)} + \frac{1}{a^2} \ln|ax+b|$$

$$\int dx x^2(ax+b)^n = \frac{1}{a^3} \left(\frac{(ax+b)^{n+3}}{n+3} - \frac{2b(ax+b)^{n+2}}{n+2} + \frac{b^2(ax+b)^{n+1}}{n+1} \right) \quad \text{con } n \neq -1, -2, -3$$

$$\int dx \frac{x^2}{(ax+b)^n} = \frac{1}{a^3} \left(\frac{b^2}{(n-1)(ax+b)^{n-1}} - \frac{2b}{(n-2)(ax+b)^{n-2}} + \frac{1}{(n-3)(ax+b)^{n-3}} \right) \quad \text{con } n \neq 1, 2, 3$$

$$\int dx \frac{x^2}{ax+b} = \frac{1}{a^3} \left(\frac{(ax+b)^2}{2} - 2b(ax+b) + b^2 \ln|ax+b| \right)$$

$$\int dx \frac{x^2}{(ax+b)^2} = \frac{1}{a^3} \left(ax+b - 2b \ln|ax+b| - \frac{b^2}{ax+b} \right)$$

$$\int dx \frac{x^2}{(ax+b)^3} = \frac{1}{a^3} \left(\ln|ax+b| + \frac{2b}{ax+b} - \frac{b^2}{2(ax+b)^2} \right)$$

$$\int \frac{dx}{x(ax+b)} = \frac{1}{b} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x^2(ax+b)} = \frac{1}{bx} + \frac{a}{b^2} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x^3(ax+b)} = \frac{2ax-b}{2b^2x^2} - \frac{a^2}{b^3} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x^n (ax+b)} = -\frac{1}{(n-1)bx^{n-1}} + \frac{a}{(n-2)b^2x^{n-2}} - \frac{a^2}{(n-3)b^3x^{n-3}} + \dots$$

$$+ (-1)^{n-1} \frac{a^{n-2}}{b^{n-1}x} + (-1)^n \frac{a^{n-1}}{b^n} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right| \quad \text{per } n = 4, 5, 6, \dots$$

$$\int \frac{dx}{x(ax+b)^2} = \frac{1}{b(ax+b)} - \frac{1}{b^2} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x(ax+b)^n} = \frac{1}{b(n-1)(ax+b)^{n-1}} + \frac{1}{b} \int \frac{dx}{x(ax+b)^{n-1}} \quad \text{per } n \neq 1$$

$$\int \frac{dx}{x^2(ax+b)^2} = -\frac{2ax+b}{b^2x(ax+b)} + \frac{2a}{b^3} \ln \left| \frac{ax+b}{x} \right|$$

W35:b.02 antiderivate di integrandi con $\sqrt{ax+b}$

$$\int dx \sqrt{ax+b} = \frac{2(ax+b)^{3/2}}{3a}$$

$$\int dx x \sqrt{ax+b} = \frac{2(ax+b)^{3/2}}{15a^2} (3ax-2b)$$

$$\int dx x^2 \sqrt{ax+b} = \frac{2(ax+b)^{3/2}}{105a^2} (15a^2x^2 - 12abx + 8b^2)$$

$$\int dx x^n \sqrt{ax+b} = \frac{2}{a(2n+3)} \left(x^n (ax+b)^{3/2} - bn \int dx x^{n-1} \sqrt{ax+b} \right)$$

$$\int dx \frac{\sqrt{ax+b}}{x} = 2\sqrt{ax+b} + b \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} \quad \text{V.(1)}$$

$$\int dx \frac{\sqrt{ax+b}}{x^n} = \frac{1}{b(n-1)} \left(\frac{(ax+b)^{3/2}}{x^{n-1}} + \frac{2n-5}{2} a \int dx \sqrt{\frac{ax+b}{x^{n-1}}} \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2\sqrt{ax+b}}{a}$$

$$\int dx \frac{x}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2b\sqrt{ax+b}}{a^2} + \frac{2(ax+b)^{3/2}}{3a^2}$$

$$\int dx \frac{x^2}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2b^2\sqrt{ax+b}}{a^3} - \frac{4b(ax+b)^{3/2}}{3a^3} + \frac{2(ax+b)^{5/2}}{5a^3}$$

$$\int dx \frac{x^n}{\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a(2n+1)} \left(x^n \sqrt{ax+b} - bn \int dx \frac{x^{n-1}}{\sqrt{ax+b}} \right)$$

$$(1) \quad \int \frac{dx}{x\sqrt{ax+b}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}} \right| & \text{sse } b > 0 \\ \frac{2}{\sqrt{-b}} \arctan \sqrt{\frac{ax+b}{-b}} & \text{sse } b < 0 \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{x^n \sqrt{ax+b}} = -\frac{\sqrt{ax+b}-\sqrt{b}}{\sqrt{ax+b}+\sqrt{b}} - \frac{(2n-3)a}{(2n-2)b} \int \frac{dx}{x^{n-1} \sqrt{ax+b}} \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{c+\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a} \left(\sqrt{ax+b} - c \ln \left| c+\sqrt{ax+b} \right| \right)$$

$$\int dx \frac{\sqrt{ax+b}}{c+\sqrt{ax+b}} = \frac{2}{a} \left(ax+b - 2c\sqrt{ax+b} + 2c^2 \ln \left| c+\sqrt{ax+b} \right| \right)$$

$$\int dx \frac{x}{c+\sqrt{ax+b}} = \frac{1}{a^2} \left(2(c^2-b)\sqrt{ax+b} - c(ax+b) + \frac{2}{3}(ax+b)^{3/2} - 2c(c^2-b) \ln \left| c+\sqrt{ax+b} \right| \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}(c+\sqrt{ax+b})} = \frac{2}{a} \ln |c + \sqrt{ax+b}|$$

$$\int \frac{dx}{(ax+b)(c+\sqrt{ax+b})} = \frac{2}{ac} \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b}}{c + \sqrt{ax+b}} \right|$$

$$\int \frac{dx}{(c+\sqrt{ax+b})^2} = \frac{2c}{a(c+\sqrt{ax+b})} + \frac{2}{a} \ln |c + \sqrt{ax+b}|$$

$$\int dx \frac{\sqrt{ax+b}}{(c+\sqrt{ax+b})^2} = \frac{2\sqrt{ax+b}}{a} - \frac{2c^2}{a(c+\sqrt{ax+b})} - \frac{4c}{a} \ln |c + \sqrt{ax+b}|$$

$$\int dx \frac{x}{(c+\sqrt{ax+b})^2} = \frac{1}{a^2} \left(-4c\sqrt{ax+b} + ax + \frac{2c(c^2-b)}{c+\sqrt{ax+b}} + 2(3c^2-b) \ln |c + \sqrt{ax+b}| \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b}(c+\sqrt{ax+b})^2} = -\frac{2}{a(c+\sqrt{ax+b})}$$

$$\int \frac{dx}{(ax+b)(c+\sqrt{ax+b})^2} = \frac{1}{ac^2} \left(\frac{2c}{c+\sqrt{ax+b}} + 2 \ln \left| \frac{\sqrt{ax+b}}{c+\sqrt{ax+b}} \right| \right)$$

W35:b.03 antiderivate di integrandi con $ax + b$ e $cx + d$

Consideriamo i reali a, b, c e d , poniamo $k := ad - bc$ e supponiamo che tale numero sia diverso da 0; consideriamo inoltre $m = 2, 3, \dots$ ed $n = 1, 2, 3, \dots$.

$$\int \frac{dx}{(x+b)^n (cx+d)^m} =$$

$$\frac{1}{k(m-1)} \left[\frac{1}{(ax+b)^{n-1} (cx+d)^{m-1}} + a(m+n-2) \int \frac{dx}{(x+b)^n (cx+d)^{m-1}} \right]$$

$$\int \frac{dx}{(ax+b)(cx+d)} = \frac{1}{k} \ln \left| \frac{ax+b}{cx+d} \right|$$

$$\int dx \frac{x}{(ax+b)(cx+d)} = -\frac{1}{k} \left(\frac{b}{a} \ln |ax+b| - \frac{d}{c} \ln |cx+d| \right)$$

$$\int \frac{dx}{(ax+b)^2 (cx+d)} = \frac{1}{k} \left(\frac{1}{ax+b} + \frac{c}{k} \ln \left| \frac{ax+b}{cx+d} \right| \right)$$

$$\int dx \frac{x}{(ax+b)^2 (cx+d)} = \frac{b}{ak(ax+b)} + \frac{d}{k^2} \ln \left| \frac{ax+b}{cx+d} \right|$$

$$\int dx \frac{x^2}{(ax+b)^2 (cx+d)} = -\frac{b^2}{a^2 k(ax+b)} + \frac{1}{k^2} \left(-\frac{b(k+ad)}{a^2} \ln |ax+b| + \frac{d^2}{c} \ln |cx+d| \right)$$

$$\int \frac{dx}{x(ax+b)(cx+d)} = \frac{1}{bd} \ln |x| - \frac{a}{bk} \ln |ax+b| + \frac{c}{dk} \ln |cx+d|$$

$$\int dx \frac{d}{x^2 (ax+b)^2 (cx+d)} = -\frac{a^2 d^2 + b^2 c^2}{b^2 d^2 k} \ln |x| - \frac{1}{bdx} + \frac{a^2}{b^2 k} \ln |ax+b| + \frac{c^2}{d^2 k} \ln |cx+d|$$

$$\int dx \frac{ax+b}{cx+d} = \frac{ax}{c} - \frac{k}{c^2} \ln |cx+d|$$

$$\begin{aligned} \int dx \frac{(ax+b)^n}{(cx+d)^m} &= \frac{1}{k(m-1)} \left(\frac{(ax+b)^{n+1}}{(cx+d)^{m-1}} + (m-n-2)a \int dx \frac{(ax+b)^n}{(cx+d)^{m-1}} \right) \\ &= -\frac{1}{(m-n-1)c} \left(\frac{(ax+b)^n}{(cx+d)^{m-1}} - kn \int dx \frac{(ax+b)^{n-1}}{(cx+d)^m} \right) \\ \int dx \sqrt{\frac{x+b}{x+d}} &= \sqrt{x+b}\sqrt{x+d} + (b-d) \ln(\sqrt{x+d} + \sqrt{x+b}) \\ \int dx \sqrt{\frac{b-x}{d+x}} &= \sqrt{b-x}\sqrt{x+d} + (b+d) \arcsin \sqrt{\frac{d+x}{b+d}} \\ \int \frac{dx}{(cx+d)\sqrt{x+b}} &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{-kc}} \ln \left| \frac{\sqrt{c(ax+b)} - \sqrt{-k}}{\sqrt{c(ax+b)} + \sqrt{-k}} \right| & \text{se } c > 0, k < 0 \\ \frac{2}{\sqrt{kc}} \arctan \sqrt{\frac{c(x+b)}{k}} & \text{se } c, k > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

W35:b.04 antiderivate di integrandi con $a^2 x^2 \pm c^2$

Consideriamo a e c i reali positivi.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{a^2 x^2 + c^2} &= \frac{1}{ac} \arctan \frac{x}{c} =: A_1 \\ \int \frac{dx}{a^2 x^2 - c^2} &= \frac{1}{2ac} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| =: B_1 \\ \int \frac{dx}{(a^2 x^2 + c^2)^2} &= \frac{x}{2c^2(a^2 x^2 + c^2)} + \frac{1}{2ac^3} \arctan \frac{ax}{c} =: A_2 \\ \int \frac{dx}{(a^2 x^2 - c^2)^2} &= -\frac{x}{2c^2(a^2 x^2 - c^2)} - \frac{1}{4ac^3} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| =: B_2 \\ A_n &:= \int \frac{dx}{(a^2 x^2 + c^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)c^2(a^2 x^2 + c^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)c^2} A_{n-1} \\ B_n &:= \int \frac{dx}{(a^2 x^2 - c^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)c^2(a^2 x^2 - c^2)^{n-1}} - \frac{2n-3}{2(n-1)c^2} B_{n-1} \\ \int dx x (a^2 x^2 \pm c^2)^n &= \frac{(a^2 x^2 \pm c^2)^{n+1}}{2(n+1)a^2} \quad \text{per } n \neq -1 \\ \int dx \frac{x}{a^2 x^2 \pm c^2} &= \frac{1}{2a^2} \ln |a^2 x^2 \pm c^2| \\ \int dx \frac{x}{(a^2 x^2 \pm c^2)^n} &= \frac{1}{2a^2(n-1)(a^2 x^2 \pm c^2)^{n-1}} \quad \text{per } n \neq 1 \\ \int \frac{dx}{x(a^2 x^2 \pm c^2)} &= \pm \frac{1}{2c^2} \ln \left| \frac{x^2}{a^2 x^2 \pm c^2} \right| \\ \int \frac{dx}{x^2(a^2 x^2 + c^2)} &= -\frac{1}{c^2 x} - \frac{a}{c^3} \arctan \frac{ax}{c} \\ \int \frac{dx}{x^2(a^2 x^2 - c^2)} &= \frac{1}{c^2 x} + \frac{a}{2c^3} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| \\ \int dx \frac{x^2}{a^2 x^2 + c^2} &= \frac{x}{a^2} - \frac{c}{a^3} \arctan \frac{ax}{c} \\ \int dx \frac{x^2}{a^2 x^2 - c^2} &= \frac{x}{a^2} + \frac{c}{2a^3} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| \end{aligned}$$

$$\int dx \frac{x^n}{a^2 x^2 \pm c^2} = \frac{x^{n-1}}{a^2(n-1)} \mp \frac{c^2}{a^2} \int dx \frac{x^{n-2}}{a^2 x^2 \pm c^2} \quad \text{per } n \neq 1$$

$$\int dx \frac{x^2}{(a^2 x^2 + c^2)^n} = -\frac{x}{2(n-1)a^2(a^2 x^2 + c^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)a^2} A_{n-1} \quad \text{per } n \neq 1$$

$$\int dx \frac{x^2}{(a^2 x^2 - c^2)^n} = -\frac{x}{2(n-1)a^2(a^2 x^2 - c^2)^{n-1}} + \frac{1}{2(n-1)a^2} B_{n-1} \quad \text{per } n \neq 1$$

$$\int dx \frac{x^m}{(a^2 x^2 \pm c^2)^n} = \frac{1}{a^2} \int dx \frac{x^{m-2}}{(a^2 x^2 \pm c^2)^{n-1}} \mp \frac{c^2}{a^2} \int dx \frac{x^{m-2}}{(a^2 x^2 \pm c^2)^n}$$

$$\int \frac{dx}{x(a^2 x^2 \pm c^2)^n} = \pm \frac{1}{2c^2(n-1)(a^2 x^2 \pm c^2)^{n-1}} \pm \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{(a^2 x^2 \pm c^2)^{n-1}} \quad \text{per } n \neq 1$$

$$\int \frac{dx}{x^2(a^2 x^2 \pm c^2)^n} = \pm \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{x^2(a^2 x^2 \pm c^2)^{n-1}} \mp \frac{a^2}{c^2} \int \frac{dx}{(a^2 x^2 \pm c^2)^n}$$

$$\int \frac{dx}{x^m(a^2 x^2 \pm c^2)^n} = \pm \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{x^m(a^2 x^2 \pm c^2)^{n-1}} \mp \frac{a^2}{c^2} \int \frac{dx}{x^{m-2}(a^2 x^2 \pm c^2)^n}$$

$$\int \frac{dx}{(px+q)(a^2 x^2 + c^2)} = \frac{1}{a^2 q^2 + c^2 p^2} \left(\frac{p}{2} \ln \frac{(px+q)^2}{a^2 x^2 + c^2} + \frac{aq}{2c} \arctan \frac{ax}{c} \right)$$

$$\int \frac{dx}{(px+q)(a^2 x^2 - c^2)} = \frac{1}{a^2 q^2 - c^2 p^2} \left(\frac{p}{2} \ln \frac{(px+q)^2}{|a^2 x^2 - c^2|} + \frac{aq}{2c} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| \right)$$

$$\int dx \frac{x}{(px+q)(a^2 x^2 + c^2)} = \frac{1}{a^2 q^2 + c^2 p^2} \left(-\frac{q}{2} \ln \frac{(px+q)^2}{a^2 x^2 + c^2} + \frac{cp}{a} \arctan \frac{ax}{c} \right)$$

$$\int dx \frac{x}{(px+q)(a^2 x^2 - c^2)} = \frac{1}{a^2 q^2 - c^2 p^2} \left(-\frac{q}{2} \ln \frac{(px+q)^2}{|a^2 x^2 - c^2|} - \frac{cp}{2a} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| \right)$$

$$\int dx \frac{x^2}{(px+q)(a^2 x^2 + c^2)} = \frac{1}{a^2 q^2 + c^2 p^2} \left(\frac{q^2}{p} \ln |px+q| + \frac{c^2 p}{2a^2} \ln(a^2 x^2 + c^2) - \frac{cq}{a} \arctan \frac{ax}{c} \right)$$

$$\int dx \frac{x^2}{(px+q)(a^2 x^2 - c^2)} = \frac{1}{a^2 q^2 - c^2 p^2} \left(\frac{q^2}{p} \ln |px+q| - \frac{c^2 p}{2a^2} \ln |a^2 x^2 - c^2| + \frac{cq}{2a} \ln \left| \frac{ax-c}{ax+c} \right| \right)$$

W35:b.05 antiderivate di integrandi con $\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}$

$$\int dx \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} = \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \pm \frac{c^2}{2a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \right|$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} = \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \right|$$

$$\int dx \frac{x}{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} = \frac{1}{a^2} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}$$

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 x^2 + c^2}} = -\frac{1}{c} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 x^2 + c^2} + c}{x} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{a^2 x^2 - c^2}} = \frac{1}{c} \arctan \frac{\sqrt{a^2 x^2 + c^2}}{c} \quad \left[= \frac{1}{c} \arccos \frac{c}{ax} \text{ se } x > 0 \right]$$

$$\int dx x \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} = \frac{1}{3a^2} (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \int dx \, x^2 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} &= \frac{x}{4a^2} (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} \mp \frac{c^2 x}{8a^2} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} - \frac{c^4}{8a^3} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \right| \\
 \int dx \frac{\sqrt{a^2 x^2 + c^2}}{x} &= \sqrt{a^2 x^2 + c^2} - c \ln \left| \frac{a^2 x^2 + c^2}{x} \right| \\
 \int dx \frac{\sqrt{a^2 x^2 - c^2}}{x} &= \sqrt{a^2 x^2 - c^2} - c \arctan \frac{\sqrt{a^2 x^2 - c^2}}{c} \\
 \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} &= \mp \frac{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}}{c^2 x} \\
 \int dx \frac{x^n}{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} &= \frac{x^{n-1} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}}{n a^2} \mp \frac{(n-1) c^2}{n a^2} \int dx \frac{x^{n-2}}{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots \\
 \int dx x^n \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} &= \frac{x^{n-1} (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}}{(n+2) a^2} \mp \frac{(n-1) c^2}{(n+2) a^2} \int dx x^{n-2} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots \\
 \int dx \frac{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}}{x^n} &= \mp \frac{(a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}}{(n-1) c^2 x^{n-1}} \mp \frac{(n-4) a^2}{(n-1) c^2} \int dx \frac{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}}{x^{n-2}} \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots \\
 \int \frac{dx}{x^n \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} &= \mp \frac{\sqrt{(a^2 x^2 \pm c^2)}}{(n-1) c^2 x^{n-1}} \mp \frac{(n-2) a^2}{(n-1) c^2} \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} \quad \text{per } n = 1, 2, 3, \dots \\
 \int \frac{dx}{(x-b) \sqrt{x^2 - b^2}} &= -\frac{1}{b} \sqrt{\frac{x+b}{x-b}} \quad \text{per } b < 0 \wedge b > 0 \\
 \int \frac{dx}{(x-b) \sqrt{p x^2 + q}} &= \left\lfloor t := \frac{1}{x-b} \right\rfloor = -\text{sign}(b) \int \frac{dt}{\sqrt{(p b^2 + q) t^2 + 2 p b t + p}} \quad \text{per } b \in \mathbb{R} \\
 \int \frac{dx}{(x-b)^n \sqrt{p x^2 + q}} &= \left\lfloor t := \frac{1}{x-b} \right\rfloor = -\text{sign}(b) \int dt \frac{t^{n-1}}{\sqrt{(p b^2 + q) t^2 + 2 p b t + p}} \quad \text{per } b \in \mathbb{R} \\
 \int dx (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} &= \frac{x}{4} (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} \pm \frac{3 c^2 x}{8} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} + \frac{3 c^4}{8 a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \right| \\
 \int dx x (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} &= \frac{1}{5 a^2} (a^2 x^2 \pm c^2)^{5/2} \\
 \int dx x^2 (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} &= \frac{x^3}{6} (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} \pm \frac{c^2}{2} \int dx x^2 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \\
 \int dx x^3 (a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2} &= \frac{1}{7 a^4} (a^2 x^2 \pm c^2)^{7/2} \mp \frac{c^2}{5 a^4} (a^2 x^2 \pm c^2)^{5/2} \\
 \int dx \frac{(a^2 x^2 + c^2)^{3/2}}{x} &= \frac{1}{3} (a^2 x^2 + c^2)^{3/2} + c^2 \sqrt{a^2 x^2 + c^2} - c^3 \ln \left| \frac{c + \sqrt{a^2 x^2 + c^2}}{x} \right| \\
 \int dx \frac{(a^2 x^2 - c^2)^{3/2}}{x} &= \frac{1}{3} (a^2 x^2 - c^2)^{3/2} - c^2 \sqrt{a^2 x^2 - c^2} + c^3 \arctan \frac{\sqrt{a^2 x^2 - c^2}}{c} \\
 \int \frac{dx}{(a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}} &= \pm \frac{x}{c^2 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} \\
 \int dx \frac{x}{(a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}} &= -\frac{1}{a^2 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} \\
 \int dx \frac{x^2}{(a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}} &= -\frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} + \frac{1}{a^3} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2} \right| \\
 \int dx \frac{x^3}{(a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}} &= \pm \frac{c^2}{a^4 \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} + \frac{1}{a^4} \sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{x(a^2 x^2 + c^2)^{3/2}} = \frac{1}{c^2 \sqrt{a^2 x^2 + c^2}} - \frac{1}{c^3} \ln \left| \frac{c + \sqrt{a^2 x^2 + c^2}}{x} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x(a^2 x^2 - c^2)^{3/2}} = -\frac{1}{c^2 \sqrt{a^2 x^2 - c^2}} - \frac{1}{c^3} \arctan \frac{\sqrt{a^2 x^2 - c^2}}{c}$$

$$\int \frac{dx}{x^2(a^2 x^2 \pm c^2)^{3/2}} = -\frac{1}{c^4} \left(\frac{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}}{x} + \frac{a^2 x}{\sqrt{a^2 x^2 \pm c^2}} \right)$$

$$\int \frac{dx}{x^3(a^2 x^2 + c^2)^{3/2}} = -\frac{1}{2c^2} \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{a^2 x^2 + c^2}} + \frac{3a^2}{c^2 \sqrt{a^2 x^2 + c^2}} + \frac{3a^2}{c^3} \ln \left| \frac{\sqrt{a^2 x^2 + c^2} - c}{x} \right| \right)$$

$$\int \frac{dx}{x^3(a^2 x^2 - c^2)^{3/2}} = \frac{1}{2c^2} \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{a^2 x^2 - c^2}} - \frac{3a^2}{c^2 \sqrt{a^2 x^2 - c^2}} - \frac{3a^2}{c^3} \arctan \frac{\sqrt{a^2 x^2 - c^2}}{c} \right)$$

W35:b.06 antiderivate di integrandi con $c^2 - a^2 x^2$ per $a, c > 0$

$$\int \frac{dx}{c^2 - a^2 x^2} = \frac{1}{2ac} \ln \left| \frac{c + ax}{c - ax} \right| =: C_1$$

$$\int \frac{dx}{(c^2 - a^2 x^2)^2} = \frac{x}{2c^2(c^2 - a^2 x^2)} + \frac{1}{4ac^3} \ln \left| \frac{c + ax}{c - ax} \right| =: C_2$$

(1)
$$\int \frac{dx}{(c^2 - a^2 x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)c^2(c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2(n-1)c^2} C_{n-1} =: C_n$$

$$\int dx x (c^2 - a^2 x^2)^n = -\frac{(c^2 - a^2 x^2)^{n+1}}{2(n+1)a^2} \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx \frac{x}{c^2 - a^2 x^2} = -\frac{1}{2a^2} \ln |c^2 - a^2 x^2|$$

$$\int dx \frac{x}{(c^2 - a^2 x^2)^n} = -\frac{1}{2a^2(n-1)(c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x(c^2 - a^2 x^2)} = -\frac{1}{2c^2} \ln \left| \frac{x^2}{c^2 - a^2 x^2} \right|$$

(2)
$$\int \frac{dx}{x^2(c^2 - a^2 x^2)} = -\frac{1}{c^2 x} + \frac{a}{2c^3} \ln \left| \frac{c + ax}{c - ax} \right|$$

$$\int dx \frac{x^2}{c^2 - a^2 x^2} = -\frac{x}{a^2} + \frac{c}{2a^3} \ln \left| \frac{c + ax}{c - ax} \right|$$

$$\int dx \frac{x^n}{c^2 - a^2 x^2} = -\frac{x^{n-1}}{a^2(n-1)} + \frac{c^2}{a^2} \int dx \frac{x^{n-2}}{c^2 - a^2 x^2}$$

$$\int dx \frac{x^2}{(c^2 - a^2 x^2)^n} = \frac{x}{2(n-1)a^2(c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} - \frac{1}{2(n-1)a^2} C_{n-1}$$

$$\int dx \frac{x^m}{(c^2 - a^2 x^2)^n} = -\frac{1}{a^2} \int dx \frac{x^{m-2}}{(c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} + \frac{c^2}{a^2} \int dx \frac{x^{m-2}}{(c^2 - a^2 x^2)^n}$$

$$\int \frac{dx}{x(c^2 - a^2 x^2)^n} = \frac{1}{2(n-1)c^2(c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} + \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{x^2(c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} \quad \text{per } n \neq 1$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x^2 (c^2 - a^2 x^2)^n} &= \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{x^2 (c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} + \frac{a^2}{c^2} \int \frac{dx}{(c^2 - a^2 x^2)^n} \\
 \int \frac{dx}{x^m (c^2 - a^2 x^2)^n} &= \frac{1}{c^2} \int \frac{dx}{x^m (c^2 - a^2 x^2)^{n-1}} + \frac{a^2}{c^2} \int \frac{dx}{x^{m-2} (c^2 - a^2 x^2)^n} \\
 \int \frac{dx}{(px+q)(c^2 - a^2 x^2)} &= \frac{1}{c^2 p^2 - a^2 q^2} \left(\frac{p}{2} \ln \frac{(px+q)^2}{|c^2 - a^2 x^2|} + \frac{aq}{2c} \ln \left| \frac{c-ax}{c+ax} \right| \right) \\
 \int dx \frac{x}{(px+q)(c^2 - a^2 x^2)} &= \frac{1}{c^2 p^2 - a^2 q^2} \left(-\frac{q}{2} \ln \frac{(px+q)^2}{|c^2 - a^2 x^2|} - \frac{cp}{2a} \ln \left| \frac{c-ax}{c+ax} \right| \right) \\
 \int dx \frac{x^2}{(px+q)(c^2 - a^2 x^2)} &= \\
 &\frac{1}{c^2 p^2 - a^2 q^2} \left(\frac{q^2}{p} \ln |px+q| - \frac{c^2 p}{2a^2} \ln |c^2 - a^2 x^2| + \frac{cq}{2a} \ln \left| \frac{c-ax}{c+ax} \right| \right) \\
 \int dx \sqrt{c^2 - a^2 x^2} &= \frac{x}{2} \sqrt{c^2 - a^2 x^2} + \frac{c^2}{2a} \arcsin \frac{ax}{c} \\
 \int \frac{dx}{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}} &= \frac{1}{a} \arcsin \frac{ax}{c} \\
 \int dx \frac{x}{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}} &= -\frac{1}{a^2} \sqrt{c^2 - a^2 x^2} \\
 \int \frac{dx}{x \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} &= -\frac{1}{c} \ln \left| \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2} + c}{x} \right| \\
 \int dx x \sqrt{c^2 - a^2 x^2} &= -\frac{1}{3a^2} (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} \\
 \int dx x^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2} &= -\frac{x}{4a^2} (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} + \frac{c^2 x}{8a^2} \sqrt{c^2 - a^2 x^2} + \frac{c^4}{8a^3} \arcsin \frac{ax}{c} \\
 \int dx \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{x} &= \sqrt{c^2 - a^2 x^2} - c \ln \left| \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2} + c}{x} \right| \\
 \int \frac{dx}{x^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} &= -\frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{c^2 x} \\
 \int dx x^n \sqrt{c^2 - a^2 x^2} &= -\frac{x^{n-1} (c^2 - a^2 x^2)^{3/2}}{(n+2)a^2} + \frac{(n-1)c^2}{(n+2)a^2} \int dx x^{n-2} \sqrt{c^2 - a^2 x^2} \quad \text{per } n > 0 \\
 \int dx \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{x^n} &= -\frac{(c^2 - a^2 x^2)^{3/2}}{(n-1)c^2 x^{n-1}} + \frac{(n-4)a^2}{(n-1)c^2} \int dx \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{x^{n-2}} \quad \text{per } n > 1 \\
 \int \frac{dx}{x^n \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} &= -\frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{(n-1)c^2 x^{n-1}} + \frac{(n-2)a^2}{(n-1)c^2} \int \frac{dx}{x^{n-2} \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} \quad \text{per } n > 1 \\
 \int \frac{dx}{(x-b)\sqrt{px^2+q}} &= \left\lfloor t := \frac{1}{x-b} \right\rfloor = -\text{sign}(x-b) \int \frac{dT}{\sqrt{(pb^2+q)t^2 + 2pbT+p}} \\
 \int \frac{dx}{(x-b)^n \sqrt{px^2+q}} &= \left\lfloor t := \frac{1}{x-b} \right\rfloor = -\text{sign}(x-b)^n \int dt \frac{t^{n-1}}{\sqrt{(pb^2+q)t^2 + 2pbT+p}} \\
 \int dx (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} &= \frac{x}{4} (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} + \frac{3c^2 x}{8} \sqrt{c^2 - a^2 x^2} + \frac{3c^4}{8a} \arcsin \frac{ax}{c} \\
 \int dx x (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} &= \frac{1}{5a^2} (c^2 - a^2 x^2)^{5/2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int dx \, x (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} &= \frac{1}{5 a^2} (c^2 - a^2 x^2)^{5/2} \\
 \int dx \, x^2 (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} &= \frac{x^3}{6} (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} + \frac{c^2}{2} \int dx \, x^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2} \\
 \int dx \, x^3 (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} &= \frac{1}{7 a^4} (c^2 - a^2 x^2)^{7/2} - \frac{c^2}{5 a^4} (c^2 - a^2 x^2)^{5/2} \\
 \int dx \frac{(c^2 - a^2 x^2)^{3/2}}{x} &= \frac{1}{3} (c^2 - a^2 x^2)^{3/2} + c^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2} - c^3 \ln \left| \frac{c + \sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{x} \right| \\
 \int \frac{dx}{(c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= \frac{x}{c^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} \\
 \int dx \frac{x}{(c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= \frac{1}{a^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} \\
 \int dx \frac{x^2}{(c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= \frac{x}{a^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} - \frac{1}{a^3} \arcsin \frac{a x}{c} \\
 \int dx \frac{x^3}{(c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= \frac{c^2}{a^4 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} + \frac{1}{a^4} \sqrt{c^2 - a^2 x^2} \\
 \int \frac{dx}{x (c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= \frac{1}{c^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} + \frac{1}{c^3} \ln \left| \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2} - c}{x} \right| \\
 \int \frac{dx}{x^2 (c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= \frac{1}{c^4} \left(\frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}}{x} - \frac{a^2 x}{\sqrt{c^2 - a^2 x^2}} \right) \\
 \int \frac{dx}{x^3 (c^2 - a^2 x^2)^{3/2}} &= -\frac{1}{2 c^2} \left(\frac{1}{x^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} - \frac{3 a^2}{c^2 \sqrt{c^2 - a^2 x^2}} - \frac{3 a^2}{c^3} \ln \left| \frac{\sqrt{c^2 - a^2 x^2} - c}{x} \right| \right)
 \end{aligned}$$

W35:b.07 antiderivate di integrandi con $a x^2 + b x + c$

Poniamo $k := 4ac - b^2$; osserviamo anche che si può scrivere $a x^2 + b x + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$ e che questa espressione, posto $t := x + \frac{b}{2a}$, assume la forma $a t^2 + \bar{b}$ esaminata in ???

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{a x^2 + b x + c} &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{-k}} \ln \left| \frac{2 a x + b - \sqrt{-k}}{2 a x + b + \sqrt{-k}} \right| & \text{sse } 4 a c < b^2 \\ \frac{2}{\sqrt{k}} \arctan \frac{2 a x + b}{\sqrt{k}} & \text{sse } 4 a c > b^2 \\ -\frac{2}{2 a x + b} & \text{sse } 4 a c = b^2 \end{cases} \\
 \int dx \frac{x}{a x^2 + b x + c} &= \frac{1}{2 a} \ln |2 a x^2 + b x + c| - \frac{b}{2 a} \int \frac{dx}{a x^2 + b x + c} \\
 \int \frac{dx}{(a x^2 + b x + c)^2} &= \frac{2 a x + b}{k(a x^2 + b x + c)} + \frac{2 a}{k} \int \frac{dx}{a x^2 + b x + c} \\
 \int dx \frac{x}{(a x^2 + b x + c)^2} &= -\frac{b x + 2 c}{k(a x^2 + b x + c)} - \frac{b}{k} \int \frac{dx}{a x^2 + b x + c} \\
 \int \frac{dx}{x(a x^2 + b x + c)} &= \frac{1}{2 c} \ln \left| \frac{x^2}{a x^2 + b x + c} \right| - \frac{b}{2 c} \int \frac{dx}{a x^2 + b x + c}
 \end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 (ax^2 + bx + c)} = \frac{b}{2c^2} \ln \left| \frac{ax^2 + bx + c}{x^2} \right| - \frac{1}{cx} + \left(\frac{b^2}{2c^2} - \frac{a}{c} \right) \int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{a}} \ln |2ax + b + 2\sqrt{ax^2 + bx + c}| & \text{sse } a > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-a}} \arcsin \frac{-2ax - b}{\sqrt{-k}} & \text{sse } a < 0 \end{cases}$$

$$\int dx \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{a} - \frac{b}{2a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\int dx \frac{x^2}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \frac{x\sqrt{ax^2 + bx + c}}{2a} - \frac{3b}{4a} \int dx \frac{x}{\sqrt{ax^2 + bx + c}} - \frac{c}{2a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax^2 + bx + c}} = \begin{cases} -\frac{1}{\sqrt{c}} \ln \left| \frac{\sqrt{ax^2 + bx + c} + \sqrt{c}}{x} + \frac{b}{2\sqrt{c}} \right| & \text{sse } c > 0 \\ \frac{1}{\sqrt{-c}} \arcsin \frac{bx + 2c}{x\sqrt{-k}} & \text{sse } c < 0 \\ -\frac{2\sqrt{ax^2 + bx + c}}{bx} & \text{sse } c = 0 \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{ax^2 + bx + c}} = -\frac{\sqrt{ax^2 + bx + c}}{cx} - \frac{b}{2c} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\int \frac{dx}{(x-d)^n \sqrt{ax^2 + bx + c}} = \left| t := \frac{1}{x-d} \right|$$

$$= -\text{sign}(x-d) \int dt \frac{t^{n-1}}{\sqrt{(ad^2 + bd + c)^2 + (2ad + b)ta}}$$

$$\int dx \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{2ax}{4a} \sqrt{ax^2 + bx + c} + \frac{k}{8a} \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\int dx x \sqrt{ax^2 + bx + c} = \frac{(ax^2 + bx + c)^{3/2}}{3a} - \frac{b}{2a} \int dx \sqrt{ax^2 + bx + c}$$

$$\int dx x^2 \sqrt{ax^2 + bx + c} = \left(x - \frac{5b}{6a} \right) \frac{(ax^2 + bx + c)^{3/2}}{4a} + \frac{5b^2 - 4ac}{16a^2} \int dx \sqrt{ax^2 + bx + c}$$

$$\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{3/2}} = \frac{2(2ax + b)}{k\sqrt{ax^2 + bx + c}}$$

$$\int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n+1}} = \frac{2ax + b}{kn(ax^2 + bx + c)^n} + \frac{2(2n-1)a}{kn} \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

$$\int dx \frac{x}{(ax^2 + bx + c)^{n+1}} = -\frac{bx + 2c}{kn(ax^2 + bx + c)^n} - \frac{2(2n-1)b}{kn} \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

$$\int dx \frac{x^m}{(ax^2 + bx + c)^n} = \begin{cases} -\frac{x^{m-1}}{a(2n-m-1)(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{(n-m)b}{(2n-m-1)a} \int dx \frac{x^{m-1}}{(ax^2 + bx + c)^n} \\ \quad + \frac{(m-1)c}{(2n-m-1)a} \int dx \frac{x^{m-2}}{(ax^2 + bx + c)^n} & \text{sse } m \neq 2n-1 \\ \frac{1}{a} \int dx \frac{x^{m-2}}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{b}{a} \int dx \frac{x^{m-1}}{(ax^2 + bx + c)^n} - \frac{c}{a} \int dx \frac{x^{m-2}}{(ax^2 + bx + c)^n} \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{x^m (ax^2 + bx + c)^n} = -\frac{1}{(m-1)c x^{m-1} (ax^2 + bx + c)^{n-1}}$$

$$- \frac{(n+m-2)b}{(m-1)c} \int \frac{dx}{x^{m-1} (ax^2 + bx + c)^n} - \frac{(2n+m-3)a}{(m-1)c} \int \frac{dx}{x^{m-2} (ax^2 + bx + c)^n}$$

$$\int \frac{dx}{x(ax^2 + bx + c)^n} = \frac{1}{2c(n-1)(ax^2 + bx + c)^{n-1}} - \frac{b}{2c} \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

$$+ \frac{1}{c} \int \frac{dx}{(ax^2 + bx + c)^{n-1}}$$

$$\int dx (ax^2 + bx + c)^n = \frac{(2ax + b)(ax^2 + bx + c)^n}{2(2n + 1)a} - \frac{nk}{2(2n + 1)a} \int dx (ax^2 + bx + c)^{n-1}$$

$$\int dx x (ax^2 + bx + c)^n = \frac{(ax^2 + bx + c)^{n+1}}{2(n + 1)a} - \frac{b}{2a} \int dx (ax^2 + bx + c)^n$$

W35:b.08 antiderivate di integrandi con $x^3 \pm a^3$

Presentiamo solo formule riguardanti $x^3 + a^3$, ma osserviamo che le corrispondenti formule riguardanti $x^3 - a^3$ si ottengono dalle seguenti cambiando a in $-a$.

$$\int \frac{dx}{x^3 + a^3} = \frac{1}{3a^2} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{(x+a)^2}{x^2 - ax + a^2} + \sqrt{3} \arctan \frac{2x-a}{a\sqrt{3}} \right) =: I_1$$

$$\int \frac{dx}{(x^3 + a^3)^2} = \frac{x}{a^3(x^3 + a^3)} + \frac{2}{3a^3} \int \frac{dx}{x^3 + a^3} = \dots I_1$$

$$\int \frac{dx}{x^3 + a^3} = \frac{1}{3a} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{(x+a)^2}{x^2 - ax + a^2} + \sqrt{3} \arctan \frac{2x-a}{a\sqrt{3}} \right) =: I_3$$

$$\int dx \frac{x^2}{x^3 + a^3} = \frac{1}{3} \ln |x^3 + a^3|$$

$$\int \frac{dx}{x(x^3 + a^3)} = \frac{1}{3a^3} \ln \left| \frac{x^3}{x^3 + a^3} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x^2(x^3 + a^3)} = \frac{1}{a^3 x} - \frac{1}{a^3} \int dx \frac{x}{x^3 + a^3} = \dots I_3$$

$$\int \frac{dx}{x^2(x^3 - a^3)} = \frac{1}{a^3 x} - \frac{1}{a^3} \int dx \frac{x}{x^3 + a^3} = \dots I_3$$

W35:b.09 antiderivate di integrandi con $x^4 \pm a^4$

$$\int \frac{dx}{x^4 + a^4} = \frac{1}{2\sqrt{2}a^3} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{x^2 + \sqrt{2}ax + a^2}{x^2 - \sqrt{2}ax + a^2} + \arctan \frac{\sqrt{2}ax}{a^2 - x^2} + \pi \right)$$

$$\int \frac{dx}{x^4 - a^4} = \frac{1}{2a^3} \left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| - \arctan \frac{x}{a} \right)$$

$$\int dx \frac{x}{x^4 + a^4} = \frac{1}{2a^2} \arctan \frac{x^2}{a^2}$$

$$\int dx \frac{x}{x^4 - a^4} = \frac{1}{4a^2} \ln \left| \frac{x^2 - a^2}{x^2 + a^2} \right|$$

$$\int dx \frac{x^2}{x^4 + a^4} = \frac{1}{2\sqrt{2}a} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{x^2 - \sqrt{2}ax + a^2}{x^2 + \sqrt{2}ax + a^2} + \arctan \frac{\sqrt{2}ax}{a^2 - x^2} + \pi \right)$$

$$\int dx \frac{x^2}{x^4 - a^4} = \frac{1}{2a} \left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + \arctan \frac{x}{a} \right)$$

$$\int dx \frac{x^3}{x^4 \pm a^4} = \frac{1}{4} \ln |x^4 \pm a^4|$$

W35:b.10 antiderivate di integrandi con $ax^n + b$

$$\int \frac{dx}{x(ax^n + b)} = \frac{1}{bn} \ln \left| \frac{x^n}{u} \right|$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{ax^n + b}} = \begin{cases} \frac{1}{n\sqrt{b}} \ln \left| \frac{\sqrt{u}-\sqrt{b}}{\sqrt{u}+\sqrt{b}} \right| & \text{sse } b > 0 \\ \frac{2}{n\sqrt{-b}} \arctan \sqrt{\frac{u}{-b}} & \text{sse } b < 0 \end{cases}$$

Introduciamo $u := ax^n + b$ e consideriamo i parametri $m, n, p \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \int dx x^m (ax^n + b)^p &= \frac{1}{m + np + 1} \left(x^{m+1} u^p + npb \int dx x^m u^{p-1} \right) \\ &= \frac{1}{bn(p+1)} \left(-x^{m+1} u^{p+1} + (m + np + n + 1) \int dx x^m u^{p+1} \right) \\ &= \frac{1}{a(m + np + 1)} \left(x^{m-n+1} u^{p+1} - (m - n + 1)b \int dx x^{m-n} u^p \right) \\ &= \frac{1}{b(m+1)} \left(x^{m+1} u^{p+1} - (m - np + n + 1)b \int dx x^{m+n} u^p \right) \end{aligned}$$

W35:c. antiderivate di integrandi trascendenti

Le formule che seguono possono essere utilizzate anche per integrandi contenenti richiami a tangenti, cotangenti, secanti e cosecanti, pur di tenere conto che

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad , \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad , \quad \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad , \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

Nelle espressioni delle antiderivate le costanti additive arbitrarie come C e C_1 sono indicate solo in presenza di risultati formalmente diversi.

W35:c.01 antiderivate di integrandi con seno e/o coseno

$$\begin{aligned} \int dx \sin x &= -\cos x \quad , \quad \int dx \sin ax = -\frac{1}{a} \cos ax \quad , \\ \int dx \cos x &= \sin x \quad , \quad \int dx \cos ax = \frac{1}{a} \sin ax \\ \int dx \sin^2 ax &= \frac{x}{2} - \frac{\sin 2ax}{4a} \quad , \quad \int dx \cos^2 ax = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2ax}{4a} \\ \int dx \sin^3 ax &= -\frac{1}{a} \cos ax + \frac{1}{3a} \cos 3ax \quad , \quad \int dx \cos^3 ax = \frac{1}{a} \sin ax - \frac{1}{3a} \sin 3ax \\ \int dx \sin^4 ax &= \frac{3x}{8} - \frac{\sin 2ax}{4a} + \frac{\sin 4ax}{32a} \quad , \quad \int dx \cos^4 ax = \frac{3x}{8} + \frac{\sin 2ax}{4a} + \frac{\sin 4ax}{32a} \\ \int dx \sin^n ax &= -\frac{1}{na} \sin^{n-1} ax \cos ax + \frac{n-1}{n} \int dx \sin^{n-2} ax \\ \int dx \cos^n ax &= \frac{1}{na} \sin ax \cos^{n-1} ax + \frac{n-1}{n} \int dx \cos^{n-2} ax \\ \int dx \sin ax \cos^n ax &= \begin{cases} -\frac{\cos^{n+1} ax}{a(n+1)} & \text{sse } n \neq -1 \\ -\frac{1}{a} \ln |\cos ax| & \text{sse } n = -1 \end{cases} \\ \int dx \sin^n ax \cos ax &= \begin{cases} -\frac{\sin^{n+1} ax}{a(n+1)} & \text{sse } n \neq -1 \\ -\frac{1}{a} \ln |\sin ax| & \text{sse } n = -1 \end{cases} \\ \int dx \sin^m x \cos^n x &= \frac{\sin^{m+1} x \cos^{n-1} x}{m+n} + \frac{n-1}{m+n} \int dx \sin^m x \cos^{n-2} x \\ &= -\frac{\sin^{m-1} x \cos^{n+1} x}{m+n} + \frac{m-1}{m+n} \int dx \sin^{m-2} x \cos^n x \\ \int dx x \sin ax &= \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax) \\ \int dx x \cos ax &= \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax) \\ \int dx x^2 \sin ax &= \frac{1}{a^3} (2 \cos ax + 2ax \sin ax - a^2 x^2 \cos ax) \\ \int dx x^2 \cos ax &= \frac{1}{a^3} (-2 \sin ax + 2ax \cos ax + a^2 x^2 \sin ax) \\ \int dx x^n \sin ax &= -\frac{1}{a} x^n \cos ax + \frac{n}{a} \int dx x^{n-1} \cos ax \\ \int dx x^n \cos ax &= \frac{1}{a} x^n \sin ax - \frac{n}{a} \int dx x^{n-1} \sin ax \end{aligned}$$

$$\int dx x \sin^2 ax = \frac{x^2}{4} - \frac{x \sin 2ax}{4a} - \frac{\cos 2ax}{8a^2}$$

$$\int dx x \cos^2 ax = \frac{x^2}{4} + \frac{x \sin 2ax}{4a} + \frac{\cos 2ax}{8a^2}$$

$$\int dx \sin mx \sin nx = \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} - \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} \quad \text{per } m^2 \neq n^2$$

$$\int dx \sin mx \cos nx = -\frac{\cos(m-n)x}{2(m-n)} - \frac{\cos(m+n)x}{2(m+n)} \quad \text{per } m^2 \neq n^2$$

$$\int dx \cos mx \cos nx = \frac{\sin(m-n)x}{2(m-n)} + \frac{\sin(m+n)x}{2(m+n)} \quad \text{per } m^2 \neq n^2$$

W35:c.02 antiderivate di integrandi con (co)tangente e (co)secante

$$\int dx \tan ax = \frac{1}{a} \ln |\cos ax| + C = \frac{1}{a} \ln |\sec ax| + C_1$$

$$\int dx \cot ax = \int \frac{dx}{\tan ax} = \frac{1}{a} \ln |\sin ax| + C = \frac{1}{a} \ln |\csc ax| + C_1$$

$$\int dx \tan^2 ax = \frac{1}{a} \tan ax - x$$

$$\int dx \tan^3 ax = \frac{1}{2a} \tan^2 ax + \frac{1}{a} \ln |\cos ax|$$

$$\int dx \tan^n ax = \frac{1}{(n-1)a} \tan^{n-1} ax - \int dx \tan^{n-2} ax$$

$$\int dx \tan^n ax \sec^2 ax = \int dx \frac{\tan^n ax}{\cos^2 ax} = \frac{1}{(n+1)a} \tan^{n+1} ax \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx \cot^2 ax = -\frac{1}{a} \cot ax - x$$

$$\int dx \cot^3 ax = \frac{1}{2a} \cot^2 ax - \frac{1}{a} \ln |\sin ax|$$

$$\int dx \cot^n ax = -\frac{1}{(n-1)a} \cot^{n-1} ax - \int dx \cot^{n-2} ax$$

$$\int dx \cot^n ax \csc^2 ax = \int dx \frac{\cot^n ax}{\sin^2 ax} = \frac{1}{(n+1)a} \cot^{n+1} ax \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx \frac{\sec^2 ax}{\tan ax} = \int \frac{dx}{\cos^2 ax \tan ax} = \frac{1}{a} \ln |\tan ax|$$

$$\int dx \frac{\csc^2 ax}{\cot ax} = \int \frac{dx}{\sin^2 ax \cot ax} = -\frac{1}{a} \ln |\cot ax|$$

$$\int dx x \tan^2 ax = \frac{x}{a} \tan ax + \frac{1}{a^2} \ln |\cos ax| - \frac{x^2}{2}$$

$$\int dx x \cot^2 ax = -\frac{x}{a} \cot ax + \frac{1}{a^2} \ln |\sin ax| - \frac{x^2}{2}$$

$$\int \frac{dx}{b+c \tan x} = \frac{1}{b^2+c^2} (bx+c \ln |b \cos x + c \sin x|)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{b+c \tan^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{b-c}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{b-c}{b}} \sin x \right) \quad \text{per } b > 0, b^2 > c^2$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 ax} = \int dx \csc^2 ax = -\frac{1}{a} \cot ax$$

$$\int \frac{dx}{\cos^2 ax} = \int dx \sec^2 ax = \frac{1}{a} \tan ax$$

$$\int dx \sec ax = \int \frac{dx}{\cos ax} = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$\int dx \csc ax = \int \frac{dx}{\sin ax} = \frac{1}{a} \ln \left| \tan \frac{ax}{2} \right|$$

$$\int dx \sec x = \ln |\sec x + \tan x| \quad , \quad \int dx \csc x = \ln |\csc x| - \cot x$$

$$\int dx \sec ax \tan ax = \int dx \frac{\sin ax}{\cos^2 ax} = \frac{1}{a} \sec ax = \frac{1}{a \cos ax}$$

$$\int dx \csc ax \cot ax = \int dx \frac{\cos ax}{\sin^2 ax} = -\frac{1}{a} \csc x = -\frac{1}{a \sin ax}$$

$$\int \frac{dx}{\sin^n ax} = -\frac{\cos ax}{a(n-1) \sin^{n-1} ax} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^{n-2} ax}$$

$$\int \frac{dx}{\cos^n ax} = -\frac{\sin ax}{a(n-1) \cos^{n-1} ax} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} ax}$$

$$\int \frac{dx}{\sin ax \cos ax} = \frac{1}{a} \ln |\tan ax|$$

$$\int \frac{dx}{\sin ax \cos^2 ax} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{\cos ax} + \ln \left| \tan \frac{ax}{2} \right| \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sin^2 ax \cos ax} = \frac{1}{a} \left(-\frac{1}{\sin ax} + \ln \left| \tan \left(\frac{ax}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sin^m x \cos^n x} = -\frac{1}{(m-1) \sin^{m-1} x \cos^{m-1} x} + \frac{m+n-2}{m-1} \int \frac{dx}{\sin^{m-2} x \cos^n x}$$

$$= -\frac{1}{(m-1) \sin^{m-1} x \cos^{m-1} x} - \frac{m+n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\sin^m x \cos^{n-2} x}$$

$$\int dx \frac{\sin^m x}{\cos^n x} = \frac{\sin^{m+1} x}{(n-1) \cos^{n-1} x} + \frac{m+n-2}{n-1} \int dx \frac{\sin^m x}{\cos^{n-2} x}$$

$$= -\frac{\sin^{m-1} x}{(m-n) \cos^{n-1} x} + \frac{m-1}{m-n} \int dx \frac{\sin^{m-2} x}{\cos^n x}$$

$$\int dx \frac{\cos^m x}{\sin^n x} = -\frac{\cos^{n+1} x}{(m-1) \sin^{m-1} x} - \frac{m+n-2}{m-1} \int dx \frac{\cos^n x}{\sin^{m-2} x}$$

$$= \frac{\cos^{m-1} x}{(m-n) \sin^{m-1} x} + \frac{n-1}{n-m} \int dx \frac{\cos^{n-2} x}{\sin^n x}$$

$$\int dx \frac{x}{\sin^2 ax} = -\frac{x}{a} \cot ax + \frac{1}{a^2} \ln |\sin ax|$$

$$\int dx \frac{x}{\cos^2 ax} = \frac{x}{a} \tan ax + \frac{1}{a^2} \ln |\cos ax|$$

$$\int \frac{dx}{1 + \sin ax} = -\frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{ax}{2} \right)$$

$$\int \frac{dx}{1 - \sin ax} = \frac{1}{a} \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{ax}{2} \right)$$

$$\int \frac{dx}{1 + \cos ax} = \frac{1}{a} \tan \frac{ax}{2}$$

$$\int \frac{dx}{1 - \cos ax} = -\frac{1}{a} \cot \frac{ax}{2}$$

$$\int \frac{dx}{b + c \sin ax} = \begin{cases} \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \arctan \frac{b \tan(ax/2)+c}{\sqrt{b^2-c^2}} & \text{sse } b^2 > c^2 \\ \frac{1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{b \tan(ax/2)+c-\sqrt{c^2-b^2}}{b \tan(ax/2)+c+\sqrt{c^2-b^2}} \right| & \text{sse } b^2 < c^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{\sin x (b + c \sin x)} = \frac{1}{b} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \frac{c}{b} \int \frac{dx}{b + c \sin ax}$$

$$\int \frac{dx}{\sin x (1 + \sin x)} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| - \tan \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sin x (1 - \sin x)} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\int \frac{dx}{\sin x (1 - \sin x)} = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\int \frac{dx}{(b + c \sin x)^2} = \frac{c \cos x}{(b^2 - c^2)(b + c \sin x)} + \frac{b}{b^2 - c^2} \int \frac{dx}{b + c \sin x}$$

$$\int dx \frac{\sin x}{(b + c \sin x)^2} = \frac{b \cos x}{(b^2 - c^2)(b + c \sin x)} + \frac{c}{c^2 - b^2} \int \frac{dx}{b + c \sin x}$$

$$\int dx \frac{\cos x}{(b + c \sin x)^2} = -\frac{1}{c(b + c \sin x)}$$

$$\int \frac{dx}{b + c \cos ax} = \begin{cases} \frac{2}{a\sqrt{b^2-c^2}} \arctan \frac{(b-c) \tan(ax/2)}{\sqrt{b^2-c^2}} & \text{sse } b^2 > c^2 \\ \frac{1}{a\sqrt{c^2-b^2}} \ln \left| \frac{(c-b) \tan(ax/2)+\sqrt{c^2-b^2}}{(c-b) \tan(ax/2)-\sqrt{c^2-b^2}} \right| & \text{sse } b^2 < c^2 \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x (b + c \cos x)} = \frac{1}{b} \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \frac{c}{b} \int \frac{dx}{b + c \sin ax}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x (1 + \cos x)} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \tan \frac{x}{2}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x (1 - \cos x)} = \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - \cot \frac{x}{2}$$

$$\int \frac{dx}{(b + c \cos x)^2} = \frac{c \sin x}{(c^2 - b^2)(b + c \cos x)} - \frac{b}{c^2 - b^2} \int \frac{dx}{b + c \cos x}$$

$$\int dx \frac{\cos x}{(b + c \cos x)^2} = \frac{b \sin x}{(b^2 - c^2)(b + c \cos x)} - \frac{c}{b^2 - c^2} \int \frac{dx}{b + c \sin x}$$

$$\int dx \frac{\sin x}{(b + c \cos x)^2} = \frac{1}{c(b + c \cos x)}$$

Dati b e c reali nonnulli, introduciamo $r := \sqrt{b^2 + c^2}$ e $\phi := \arctan \frac{b}{c}$

$$\int \frac{dx}{b \cos x + c \sin x} = \frac{1}{r} \ln \left| \tan \frac{x + \phi}{2} \right| \quad \text{per } c > 0$$

$$\int \frac{dx}{a + b \cos x + c \sin x} = \int \frac{d\Gamma}{a + r \sin t} \quad \left\{ \begin{array}{l} t := x + \phi \\ \Gamma := x + \phi \end{array} \right.$$

$$\int dx \frac{\sin ax}{b + c \cos x} = -\frac{1}{ac} \ln |b + c \cos ax|$$

$$\int dx \frac{\cos ax}{b + c \sin x} = -\frac{1}{ac} \ln |b + c \sin ax|$$

$$\int \frac{dx}{a \sin^2 x + b} = \int \frac{dx}{(a+b) \sin^2 x + b \cos^2 x}$$

$$\int \frac{dx}{a \cos^2 x + b} = \int \frac{dx}{(a+b) \cos^2 x + b \sin^2 x}$$

$$\int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan x \right)$$

$$\int \frac{dx}{a^2 \cos^2 x - b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{2ab} \ln \left| \frac{b \tan x + a}{b \tan x - a} \right|$$

$$\int dx \frac{\sin x}{a \cos^2 x + b} = \left\lfloor t := \cos x \right\rfloor = - \int \frac{dT}{at^2 + b}$$

$$\int dx \frac{\cos x}{a \sin^2 x + b} = \left\lfloor t := \sin x \right\rfloor = \int \frac{dT}{at^2 + b}$$

Da alcune delle presenti formule che riguardano $\sin^2 x$ si possono ricavare corrispondenti formule utilizzando la $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.

Consideriamo il parametro $a \in \mathbb{R}_+$

$$\int dx \sin x \sqrt{a \sin^2 x + b} = -\frac{\cos x}{2} \sqrt{a \sin^2 x + b} + b - \frac{a+b}{2\sqrt{a}} \arcsin \frac{\sqrt{a} \cos x}{\sqrt{a+b}}$$

$$\int dx \sin x \sqrt{b - a \sin^2 x} = -\frac{\cos x}{2} \sqrt{b - a \sin^2 x} - \frac{a-b}{2\sqrt{a}} \ln \left| \sqrt{a} \cos x + \sqrt{b - a \sin^2 x} \right|$$

$$\int dx \frac{\sin x}{\sqrt{a \sin^2 x + b}} = -\frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \frac{\sqrt{a} \cos x}{\sqrt{a+b}}$$

$$\int dx \frac{\sin x}{\sqrt{b - a \sin^2 x}} = -\frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \sqrt{a} \cos x + \sqrt{b - a \sin^2 x} \right|$$

$$\int dx \cos x \sqrt{a \sin^2 x + b} = \frac{\sin x}{2} \sqrt{a \sin^2 x + b} + \frac{b}{2\sqrt{a}} \ln \left| \sqrt{a} \sin x + \sqrt{a \sin^2 x + b} \right|$$

$$\int dx \cos x \sqrt{b - a \sin^2 x} = \frac{\sin x}{2} \sqrt{b - a \sin^2 x} + \frac{b}{2\sqrt{a}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{a}{b}} \sin x \right)$$

$$\int dx \frac{\cos x}{\sqrt{a \sin^2 x + b}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \ln \left| \sqrt{a} \sin x + \sqrt{a \sin^2 x + b} \right|$$

$$\int dx \frac{\cos x}{\sqrt{b - a \sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \arcsin \left(\sqrt{\frac{a}{b}} \sin x \right)$$

W35:c.03 antiderivate di integrandi con trigonometriche inverse

Ricordiamo che: $\int dx \frac{1}{1+x^2} = \arctan x$, $\int dx \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$

$$\int dx \arcsin ax = x \arcsin ax + \frac{1}{a} \sqrt{1-a^2 x^2}$$

$$\int dx (\arcsin ax)^2 = x (\arcsin ax)^2 - 2x + \frac{2}{a} \sqrt{1-a^2 x^2} \arcsin ax$$

$$\int dx x \arcsin ax = \frac{1}{4a^2} \left(2a^2 x^2 \arcsin ax - \arcsin ax + ax \sqrt{1-a^2 x^2} \right)$$

$$\int dx x^2 \arcsin ax = \frac{1}{9a^3} \left(3a^3 x^3 \arcsin ax + (a^2 x^2 + 2) \sqrt{1-a^2 x^2} \right)$$

$$\int dx \frac{\arcsin ax}{x^2} = -\frac{1}{x} \arcsin ax - a \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - a^2 x^2}}{ax} \right|$$

$$\int dx \arccos ax = x \arccos ax - \frac{1}{a} \sqrt{1 - a^2 x^2}$$

$$\int dx (\arccos ax)^2 = x (\arccos ax)^2 - 2x - \frac{2}{a} \sqrt{1 - a^2 x^2} \arccos ax$$

$$\int dx x \arccos ax = \frac{1}{4a^2} \left(2a^2 x^2 \arccos ax - \arccos ax - ax \sqrt{1 - a^2 x^2} \right)$$

$$\int dx x^2 \arccos ax = \frac{1}{9a^3} \left(3a^3 x^3 \arccos ax - (a^2 x^2 + 2) \sqrt{1 - a^2 x^2} \right)$$

$$\int dx \frac{\arccos ax}{x^2} = -\frac{1}{x} \arccos ax + a \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - a^2 x^2}}{ax} \right|$$

$$\int dx \arctan ax = \frac{1}{2a} (2ax \arctan ax - \ln(1 + a^2 x^2))$$

$$\int dx \operatorname{arccot} ax = \frac{1}{2a} (2ax \operatorname{arccot} ax + \ln(1 + a^2 x^2))$$

$$\int dx x \arctan ax = \frac{1}{2a^2} ((1 + a^2 x^2) \arctan ax - ax)$$

$$\int dx x^2 \arctan ax = \frac{1}{6a^3} (2a^3 x^3 \arctan ax - a^2 x^2 + \ln(1 + a^2 x^2))$$

$$\int dx \frac{\arctan ax}{x^2} = -\frac{1}{x} \arctan ax - \frac{a}{2} \ln \frac{1 + a^2 x^2}{a^2 x^2}$$

$$\int dx \operatorname{arcsec} ax = x \operatorname{arcsec} ax - \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 - 1} \right|$$

$$\int dx \operatorname{arccsc} ax = x \operatorname{arccsc} ax + \frac{1}{a} \ln \left| ax + \sqrt{a^2 x^2 - 1} \right|$$

$$\int dx x \operatorname{arcsec} ax = \frac{x^2}{2} \operatorname{arcsec} ax - \frac{1}{2a^2} \sqrt{a^2 x^2 - 1}$$

$$\int dx x \operatorname{arccsc} ax = \frac{x^2}{2} \operatorname{arccsc} ax + \frac{1}{2a^2} \sqrt{a^2 x^2 - 1}$$

W35:c.04 antiderivate di integrandi con esponenziali

$$\int dx e^{ax} = \frac{1}{a} e^{ax} \quad , \quad \int dx \eta^x = \int dx e^{x \ln \eta} = \frac{\eta^x}{\ln \eta}$$

$$\int dx x e^{ax} = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1) \quad , \quad \int dx x^2 e^{ax} = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

(1) $\int dx x^n e^{ax} =$

$$\frac{e^{ax}}{a^{n+1}} \left((ax)^n - n(ax)^{n-1} + n(n-1)(ax)^{n-2} - \dots + (-1)^n n! \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{P}$$

$$\int \frac{dx}{b + ce^{ax}} = \frac{1}{ab} \left(ax - \ln |b + ce^{ax}| \right)$$

$$\int dx \frac{e^{ax}}{b + ce^{ax}} = \frac{1}{ab} \ln |b + ce^{ax}|$$

$$\int \frac{dx}{(b + ce^{ax})^2} = \frac{x}{b^2} + \frac{1}{ab(b + ce^{ax})} - \frac{1}{ab^2} \ln |b + ce^{ax}|$$

$$\int dx \frac{e^{ax}}{(b + ce^{ax})^2} = -\frac{1}{ac(b + ce^{ax})}$$

$$\int dx x e^{ax} = \frac{1}{2a} e^{ax}$$

$$\int dx x^{2n+1} e^{ax} = \left\lfloor t := x^2 \right\rfloor = \frac{1}{2} \int dt t^n e^{at} \quad [c04(1)]$$

$$\int dx \frac{x e^{ax}}{(1 + ax)^2} = \frac{e^{ax}}{a^2(1 + ax)}$$

$$\int dx e^{ax} \sin bx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int dx e^{ax} \cos bx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

$$\int dx e^{ax} \sin^n bx = \frac{e^{ax} \sin^{n-1} bx}{a^2 + n^2 b^2} (a \sin bx - nb \cos bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \int dx e^{ax} \sin^{n-2} bx$$

$$\int dx e^{ax} \cos^n bx = \frac{e^{ax} \cos^{n-1} bx}{a^2 + n^2 b^2} (a \cos bx + nb \sin bx) + \frac{n(n-1)b^2}{a^2 + n^2 b^2} \int dx e^{ax} \cos^{n-2} bx$$

$$\int dx x e^{ax} \sin bx = \frac{x e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) - \frac{e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} ((a^2 - b^2) \sin bx - 2ab \cos bx)$$

$$\int dx x e^{ax} \cos bx = \frac{x e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx) - \frac{e^{ax}}{(a^2 + b^2)^2} ((a^2 - b^2) \cos bx + 2ab \sin bx)$$

W35:c.05 antiderivate di integrandi con logaritmi

$$\int dx \ln ax = x \ln ax - x \quad , \quad \int dx (\ln ax)^2 = x (\ln ax)^2 - 2x \ln ax + 2x$$

$$\int dx (\ln ax)^n = x (\ln ax)^n - n \int dx (\ln ax)^{n-1}$$

$$\int dx x^n (\ln ax)^n = x^{n+1} \left(\frac{\ln ax}{n+1} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx \frac{\ln ax}{x} = \frac{1}{2} (\ln ax)^2 \quad , \quad \int \frac{dx}{x \ln ax} = \ln(\ln ax)$$

$$\int dx \frac{(\ln ax)^n}{x} = \frac{(\ln ax)^{n+1}}{n+1} \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx \frac{\ln ax}{x^n} = \frac{1}{x^{n-1}} \left(\frac{\ln ax}{n-1} + \frac{1}{(n-1)^2} \right) \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx x^n (\ln ax)^m = \frac{x^{n+1}}{n+1} (\ln ax)^m - \frac{m}{n+1} \int dx x^n (\ln ax)^{m-1} \quad \text{per } n \neq -1$$

$$\int dx \ln(ax+b) = \frac{ax+b}{a} \ln(ax+b) - x$$

$$\int dx \ln(x^2+a^2) = x \ln(x^2+a^2) - 2x + 2a \arctan \frac{x}{a}$$

$$\int dx \ln(x^2-a^2) = x \ln(x^2-a^2) - 2x + a \ln \frac{x+a}{x-a}$$

$$\int dx x \ln(x^2 \pm a^2) = \frac{1}{2}(x^2 \pm a^2) \ln(x^2 \pm a^2) - \frac{x^2}{2}$$

$$\int dx \ln|x + \sqrt{x^2 + a}| = x \ln|x + \sqrt{x^2 + a}| - \sqrt{x^2 + a}$$

$$\int dx x \ln|x + \sqrt{x^2 + a}| = \left(\frac{x^2}{2} + \frac{a}{4}\right) \ln|x + \sqrt{x^2 + a}| - \frac{x\sqrt{x^2 + a}}{4}$$

$$\int dx \sin(\ln ax) = \frac{x}{2}(\sin(\ln ax) - \cos(\ln ax))$$

$$\int dx \cos(\ln ax) = \frac{x}{2}(\sin(\ln ax) + \cos(\ln ax))$$

W35:c.06 antiderivate di integrandi iperbolici e loro inverse

$$\int dx \sinh ax = \frac{1}{a} \cosh ax \quad , \quad \int dx \cosh ax = \frac{1}{a} \sinh ax$$

$$\int dx \tanh ax = \frac{1}{a} \ln(\cosh ax) \quad , \quad \int dx \coth ax = \frac{1}{a} \ln|\cosh ax|$$

$$\int dx \sinh^2 ax = \frac{1}{4a}(\sinh 2ax - 2ax)$$

$$\int dx \sinh^n ax = \frac{1}{na} \sinh^{n-1} ax \cosh ax - \frac{n-1}{n} \int dx \sinh^{n-2} ax$$

$$\int dx \operatorname{csch} ax = \int \frac{dx}{\sinh ax} = \frac{1}{a} \ln\left|\tanh \frac{ax}{2}\right|$$

$$\int dx \operatorname{sech}^2 ax = \int \frac{dx}{\cosh^2 ax} = \frac{1}{a} \tanh ax$$

$$\int dx \operatorname{sech} ax \tanh ax = \int dx \frac{\sinh ax}{\cosh^2 ax} = -\frac{1}{a} \operatorname{sech} ax$$

$$\int dx \cosh^2 ax = \frac{1}{4a}(\sinh 2ax + 2ax)$$

$$\int dx \cosh^n ax = \frac{1}{na} \cosh^{n-1} ax \sinh ax + \frac{n-1}{n} \int dx \cosh^{n-2} ax$$

$$\int dx \operatorname{sech} ax = \int \frac{dx}{\cosh ax} = \frac{2}{a} \arctan e^{ax}$$

$$\int dx \operatorname{csch}^2 ax = \int \frac{dx}{\sinh^2 ax} = -\frac{1}{a} \coth ax$$

$$\int dx \operatorname{csch} ax \coth ax = \int dx \frac{\cosh ax}{\sinh^2 ax} = -\frac{1}{a} \operatorname{csch} ax$$

$$\int dx \tanh^2 ax = x - \frac{1}{a} \tanh ax \quad , \quad \int dx \coth^2 ax = x - \frac{1}{a} \coth ax$$

$$\int dx \operatorname{arsinh} x = \int \frac{dx}{\sinh x} = \int dx \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = x \operatorname{arsinh} x - \sqrt{x^2 + 1}$$

$$\int dx \operatorname{arcosh} x = \int \frac{dx}{\cosh x} = \int dx \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) = x \operatorname{arcosh} x - \sqrt{x^2 - 1}$$

$$\int dx \operatorname{artanh} x = \int \frac{dx}{\tanh x} = x \operatorname{artanh} x + \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1)$$

$$\begin{aligned}
 \int dx \operatorname{arccoth} x &= \int \frac{dx}{\coth x} = x \operatorname{arccoth} x + \frac{1}{2} \ln(x^2 - 1) \\
 \int \frac{dx}{\operatorname{sech} x} &= \frac{x}{\operatorname{sech} x} + \frac{1}{\sinh x} \quad , \quad \int \frac{dx}{\operatorname{csch} x} = \frac{x}{\operatorname{csch} x} + \frac{\operatorname{sign} x}{\sinh x} \\
 \int dx \frac{x}{\operatorname{sech} x} &= \frac{x^2}{2 \operatorname{sech} x} - \frac{1}{2} \sqrt{1 - x^2} \quad , \quad \int dx \frac{x}{\operatorname{csch} x} = \frac{x^2}{2 \operatorname{csch} x} + \frac{\operatorname{sign} x}{2} \sqrt{1 - x^2} \\
 \int dx \frac{1}{(\sinh x)^2} &= \tanh x \quad , \quad \int dx \frac{1}{(\cosh x)^2} = \operatorname{coth} x
 \end{aligned}$$

W35:d. integrali definiti

Ricordiamo la costante di Euler-Mascheroni $\gamma_{em} = 0.57721\ 56649$ [I13d03]

e la funzione Gamma $\Gamma(z) := \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^z n!}{z(z+1)(z+2)\cdots(z+n)}$ [W60d01]

W35:d.01 integrali definiti di integrandi algebrici

$$\int_a^b dx x^{m-1} (1-x)^{n-1} = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} \quad \text{per } m, n > 0$$

$$\int_0^1 dx (x-a)^{m-1} (b-x)^{n-1} = (b-a)^{m+n-1} \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} \quad \text{per } m, n > 0, a < b$$

$$\int_0^1 dx \frac{x^n}{1+x} = (-1)^n \left(\ln 2 - 1 + \frac{1}{2} - \dots + \frac{(-1)^n}{n} \right) \quad \text{per } n \in \mathbb{P}$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{1/n}} = \frac{\pi}{n \sin \frac{\pi}{n}} \quad \text{per } n > 1$$

$$\int_0^1 dx \frac{x^a}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(\frac{a+1}{2})}{2 \Gamma(\frac{a+2}{2})} \quad \text{per } -1 < a$$

$$\int_0^1 dx \frac{x^{a-1}}{(1-x)^a} = \frac{\pi}{\sin a \pi} \quad \text{per } 0 < a < 1$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^a}} = \frac{\sqrt{\pi} \Gamma(1/a)}{a \Gamma(\frac{1}{a} + \frac{1}{2})}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^a} = \frac{\pi}{a \sin \frac{\pi}{a}} \quad \text{per } a > 1$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^a (1+x)} = \frac{\pi}{b \sin a x} \quad \text{per } 0 < a < 1$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{x^{a-1}}{1+x^b} = \frac{\pi}{b \sin(\frac{a\pi}{b})} \quad \text{per } 0 < a < b$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{\pi}{2a} \quad \text{per } 0 < a$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^n} = \frac{\pi (2n-3)!!}{2 a^{2n-1} (2n-2)!!} \quad \text{per } 0 < a, n = 2, 3, 4, \dots$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)} = \frac{\pi}{2ab(a+b)} \quad \text{per } a, b > 0$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{x^{m-1}}{(ax+b)^{m+n}} = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{a^m b^n \Gamma(m+n)} \quad \text{per } a, b, m, n > 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{ax^2+2bx+c} = \frac{1}{\sqrt{ac-b^2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{b}{\sqrt{ac-b^2}} \right) \quad \text{per } a, ac-b^2 > 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{ax^2+2bx+c} = \frac{\pi}{2\sqrt{cd}} \quad \text{ove } d := 2(b+\sqrt{ac}) \quad \text{per } a, c, d > 0$$

$$\int_1^{+\infty} dx \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) = \gamma_{em} \quad \text{[I13d03]}$$

W35:d.02 integrali definiti di integrandi esponenziali

Consideriamo $a \in \mathbb{R}_+$, $n \in \mathbb{N}$, $h \in \mathbb{P}$.

$$\int_0^{+\infty} dx x^c e^{-ax} = \frac{\Gamma(c+1)}{a^{c+1}} \quad \text{per } c \in (-1, +\infty)$$

$$\int_0^{+\infty} dx \sqrt{x} e^{-ax} = \frac{1}{2a} \sqrt{\pi}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^n e^{-x} = n! \quad \text{per } n \in \mathbb{N}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^n e^{-ax} = \frac{n!}{a^{n+1}} \quad \text{per } n \in \mathbb{N}$$

$$\int_0^{+\infty} dx e^{-ax^2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^2 e^{-ax^2} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^{2h} e^{-ax^2} = \frac{2n-1}{2a} \int_0^{+\infty} dx x^{2h} e^{-ax^2} = \frac{(2h-1)!!}{2^{h+1}} \sqrt{\frac{\pi}{a^{2h+1}}} = \frac{(2h)!}{h! 2^{2h+1} 2^{h+1}} \sqrt{\frac{\pi}{a^{2h+1}}}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^c e^{-ax^2} = \frac{1}{2} \frac{\Gamma((c+1)/2)}{a^{(c+1)/2}}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^{2h} e^{-ax^2} = \frac{(2h-1)!!}{2^{h+1} a^h} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \text{per } h \in \mathbb{N}$$

$$\int_0^{+\infty} dx x^{2h+1} e^{-ax^2} = \frac{h!}{2 a^{h+1}} \quad \text{per } h \in \mathbb{N}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{2bx-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/a} \quad \text{per } a > 0, b \in \mathbb{R}$$

$$\int_0^1 dx x^{-x} = \int_0^1 dx e^{-x \ln x} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^n} \approx 1.29128 59970 62664$$

$$\int_0^1 dx x^x = \int_0^1 dx e^{x \ln x} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^n} = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(-n)^n} \approx 0.78343 05107 12134$$

W35:d.03 integrali definiti di integrandi logaritmici

$$\int_0^1 dx (\ln x)^n = (-1)^n n! \quad \text{per } n \in \mathbb{P}$$

$$\int_0^1 dx \ln |\ln x| = \int_0^{+\infty} dx e^{-x} \ln x = \gamma_{em}$$

$$\int_0^1 dx \frac{\ln x}{x-1} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\int_0^1 dx \frac{\ln x}{x+1} = -\frac{\pi^2}{12}$$

$$\int_0^1 dx \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

W35:d.04 integrali definiti di integrandi trigonometrici

$$\int_0^{\pi/2} dx \sin^n x = \int_0^{\pi/2} dx \cos^n x = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} & \text{per } n = 1, 3, 5, \dots \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2} & \text{per } n = 2, 4, 6, \dots \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2} dx \sin^a x = \int_0^{\pi/2} dx \cos^a x = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma(\frac{a+1}{2})}{\Gamma(\frac{a+2}{2})} \quad \text{per } a > -1$$

$$\int_0^{\pi} dx x \sin^n x = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \pi & \text{per } n = 1, 3, 5, \dots \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi^2}{2} & \text{per } n = 2, 4, 6, \dots \\ \frac{n^{3/2}}{2} \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n+2}{2})} & \text{per } n > -1 \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2} dx \sin^{2a+1} x \cos^{2b+1} x = \frac{\Gamma(a+1)\Gamma(b+1)}{2\Gamma(a+b+2)}$$

Consideriamo gli interi m ed n .

$$\int_0^{\pi} dx \sin mx \sin nx = \begin{cases} 0 & \text{per } m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & \text{per } m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} dx \cos mx \cos nx = \begin{cases} 0 & \text{per } m \neq n \\ \frac{\pi}{2} & \text{per } m = n \neq 0 \\ \pi & \text{per } m = n = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi} dx \sin mx \cos nx = \begin{cases} 0 & \text{per } m+n \text{ pari} \\ \frac{2m}{m^2-n^2} & \text{per } m+n \text{ dispari} \end{cases}$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a \cos x} = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a \sin x} = \frac{\arccos a}{\sqrt{1-a^2}} \quad \text{per } |a| < 1$$

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{1+a \sin x} = \frac{2 \arccos a}{\sqrt{1-a^2}} \quad \text{per } -1 < a < 1$$

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{1+a \cos x} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} \quad \text{per } -1 < a < 1$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{\pi}{2ab} \quad \text{per } a, b > 0$$

$$\int_0^{+\infty} dx \sin x^2 = \int_0^{+\infty} dx \cos x^2 = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \sin x^a = \Gamma\left(1 + \frac{1}{a}\right) \sin \frac{\pi}{2a}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \cos x^a = \Gamma\left(1 + \frac{1}{a}\right) \cos \frac{\pi}{2a}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\sin ax}{x} = \frac{\pi}{2} \quad \text{per } a > 0$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \int_0^{+\infty} dx \frac{\cos x}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\sin^3 x}{x^3} = \frac{3\pi}{8}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\sin^4 x}{x^4} = \frac{\pi}{3}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\sin x}{x^a} = \frac{\pi}{2\Gamma(a) \sin(a\pi/2)} \quad \text{per } 0 < a < 2$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\cos x}{x^a} = \frac{\pi}{2\Gamma(a) \cos(a\pi/2)} \quad \text{per } 0 < a < 1$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\cos ax - \cos bx}{x} = \ln \frac{b}{a}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{x \sin ax}{b^2 + x^2} = \frac{\pi}{2} e^{-ab} \quad \text{per } a, b > 0$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\cos ax}{b^2 + x^2} = \frac{\pi}{2b} e^{-ab} \quad \text{per } a, b > 0$$

W35:d.05 integrali definiti di integrandi espotrigonometrici e logtrigonometrici

Consideriamo $a > 0$, $n \in \mathbb{N}$, $h \in \mathbb{P}$.

$$\int_0^{+\infty} dx e^{-ax} \sin bx = \frac{b}{a^2 + b^2}, \quad \int_0^{+\infty} dx x e^{-ax} \sin bx = \frac{2ab}{(a^2 + b^2)^2}$$

$$\int_0^{+\infty} dx e^{-ax} \cos bx = \frac{a}{a^2 + b^2}, \quad \int_0^{+\infty} dx x e^{-ax} \cos bx = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{e^{-ax} \sin bx}{x} = \arctan \frac{b}{a} \quad \text{per } a > 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \ln(\sin x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \ln(\cos x) = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

$$\int_0^{+\infty} dx \int_z^{\frac{\pi}{4}} dx \ln(1 + \tan x) = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

$$\int_0^{+\infty} dx \frac{\sin x}{x} \ln x = -\frac{\pi}{2} \gamma_{em}$$

Testi dell'esposizione in <http://www.mi.imati.cnr.it/alberto/> e in <http://arm.mi.imati.cnr.it/Matexp/>