1

Capitolo G70 repertorio di curve piane speciali

Contenuti delle sezioni

- a. considerazioni introduttive p. 2
- b. curve algebriche di grado 2 p. 4
- c. curve algebriche di grado 3 p. 6
- d. curve algebriche di grado 4 p. 9
- e. curve algebriche di grado 5 p. 13
- f. curve algebriche di grado 6 p. 14
- g. curve algebriche di grado 7 e 8 p. 17
- h. famiglie con curve algebriche di gradi diversi p. 18
- i. cicloidi, epicicloidi e ipocicloidi p. 19
- j. spirali p. 20
- k. altre curve trascendenti p. 22
- l. curve ricavate da altre curve p. 26
- m. altre collezioni di curve p. 28
- n. indice kwic dei nomi di curve piane p. 29

37 pagine

G700.01 Questo capitolo raccoglie definizioni, proprietà principali e riferimenti, principalmente sitografici, per un centinaio tra curve piane speciali e famiglie di tali entità.

Si tratta di una raccolta di termini e di risultati che solo in piccola parte sono sostenuti da deduzioni. Per alcune curve sono segnalate anche applicazioni di rilievo.

Il capitolo si chiude con un indice terminologico che vuole facilitare la consultazione del materiale.

G70 a. considerazioni introduttive

G70a.01 I paragrafi che seguono sono costituiti da sezioni ciascuna delle quali dedicata a una entità che appartiene ai generi seguenti.

- Singola curva che rappresenta una classe di similitudine di curve.
- Famiglia di curve caratterizzata da almeno una equazione nella quale entrano uno o più costanti che consentono di distinguere le singole curve (classi di similitudine) della famiglia;
- Tipo di curve caratterizzato da un tipo di costruzione che si può applicare a tutte le curve piane che posseggano caratteristiche poco restrittive (come regolarità, costituzione di curva chiusa e limitatezza); queste costruzioni di curve basate su curve spesso hanno natura geometrica, ma talora natura cinematica e meccanica; queste costruzioni qui le chiamiamo **trasformazioni costruttive**.
- Collezione di curve caratterizzata da una proprietà.

La distinzione tra questi generi di entità non è sempre ben definita. Ogni entità è caratterizzata da uno o più nomi che spesso fanno riferimento a personalità della storia della matematica o di discipline scientifiche e tecnologiche.

Le entità sono presentate in 12 paragrafi con estensioni differenziate: 7 di questi riguardano le curve algebriche che vengono distinte considerandone i gradi; 3 paragrafi contengono curve trascendenti distinguendo tra cicloidi e curve affini, spirali e altre. Il penultimo paragrafo presenta le curve ricavabili da altre curve mediante una determinata trasformazione costruttiva. L'ultimo riguarda le collezioni di curve individuate da uno specifico comportamento.

G70a.02 Le entità vengono presentate con nomi e formule di definizione. Queste formule riguardano equazioni cartesiane nelle variabili x e y e talora in variabili alternative X e Y, equazioni polari nelle variabili ρ e ϕ , parametrizzazioni cartesiane e parametrizzazioni polari nel parametro t e talora nel parametro alternativo t. Per ragioni di semplicità, si privilegiano le formule costituenti le forme canoniche dalle quali si possono ricavare più facilmente le proprietà principali. Solo raramente si considerano formule che abbracciano la totalità dei casi.

Attualmente solo in pochi casi le definizioni sono seguite da proprietà e descrizioni ottenute con dimostrazioni o argomentazioni stringenti. Attualmente non compare alcuna figura: molte figure e notevoli animazioni si possono tuttavia raggiungere attraverso la sitografia presente per ciascuna delle entità che seguono.

Tra le entità esistono varie relazioni: le relazioni di appartenenza di curve a famiglie e collezioni, le relazioni di inclusione tra famiglie e collezioni e le relazioni dovute a trasformazioni costruttive.

G70a.03 Oltre alle versioni inglese, italiana e francese di Wikipedia [Main page (we), Pagina Principale (wi) e https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Accueil principal] qui vengono citati più volte pagine dei siti che seguono attraverso segnalazioni sintetiche dei loro URL.

Sito Encyclopédie des Formes Mathématiques Remarquables (http://www.mathcurve.com/) dovuto a Robert Ferreol per il quale abbreviamo http://http://www.mathcurve.com/courbes2d/xxxx con EFMR2D/xxxx.

Settore Famous Curves Index del sito https://it.wikipedia.org/wiki/MacTutor dovuto a Robert John O'Connor e Edmund F. Robertson.

 $\verb|http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/| history/Curves/Curves.html|,$

abbreviando http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/ history/Curves/xxxx con FAMCUR/xxxx

MATeXp - Geometria

Enciclopedia in linea Wolfram MathWorld (http://mathworld.wolfram.com/letters/) iniziativa avviata da Eric Weisstein.

abbreviando http://http://mathworld.wolfram.com/xxxx con MW/xxxx

Sito 2dcurves.com o Mathematical curves (http://ttp://www.2dcurves.com/) dovuto a Wassenaar per il quale abbreviamo http://http://www.2dcurves.com/xxxx con 2DCURVES/xxxx

Settore A Visual Dictionary of Special Plane Curves (http://xahlee.org/PageTwo_dir/more.html del sito xahlee, per il quale usiamo l'abbreviazione XAHLEE/xxxx per

http://http://xahlee.org/SpecialPlaneCurves_dir/xxxx.

Sito OEIS, On-Line Encyclopedia of Integer Sequences dovuto a Neil Sloane

[http://http://www.research.att.com/~njas/sequences/] per il quale abbreviamo

G70a.04 Ricordiamo anche i testi che seguono.

J. Dennis Lawrence (1972): A catalog of special plane curves, Dover Publications — ISBN 0-486-60288-5 Lockwood , E. H. (1961): A Book of Curves, Cambridge University Press

Yates , Robert Carl (1952): Curves and their Properties, National Council of Teachers of Mathematics Cundy , Henry Martin ; Rollett , A. P. (1989): Mathematical Models, 3rd ed. Tarquin Pub. Stradbroke, England

Shikin, E. V. (1995): Handbook and Atlas of Curves, CRC Press, Boca Raton

Salmon, George (1879): A Treatise on the Higher Plane Curves, Hodges, Foster, and Figgis

G70 b. curve algebriche di grado 2

G70b.01 sezioni coniche Curve piane discusse in G50. Una sezione conica è definibile come intersezione tra un cono circolare retto e un piano, oppure come insieme dei punti determinati da un'equazione polare della forma

$$\rho = (1 - e \cos \phi) \quad \text{con } e \in \mathbb{R}_+$$

(e viene detta eccentricità della conica) oppure come soluzione reale di un'equazione quadratica della forma

$$ax^{2} + 2hxy + by^{2} + 2gx + 2fy + c = 0$$
.

Segnaliamo anche Sezioni coniche (wi) e http://EFMR2D/conic/conic.shtml.

G70b.02 parabola Conica di eccentricità 1, discussa come tale in G50 e in particolare in G50b. Si può caratterizzare con un'equazione cartesiana, una parametrizzazione cartesiana o con un'equazione polare:

$$y^2 = 2 p x \quad \text{dove} \quad p \in \mathbb{R}_+$$

$$\begin{cases} x = \frac{p}{2} t^2 \\ y = p t \end{cases} \quad \text{con } p \in \mathbb{R}_+$$

$$\rho = \frac{p}{1 + \cos \phi} = \frac{p}{2 \cos^2 \frac{\phi}{2}}$$

V.a. Parabola (wi), EFMR2D/parabole/parabole.shtml

G70b.03 ellisse Conica, discussa come tale in G50 e in particolare in G50c, fornita in una sua forma canonica dall'equazione cartesiana

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{dove} \quad a, b \in \mathbb{R}_+ \ .$$

Equivalentemente si può caratterizzare con la parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad \text{per} \quad 0 \le t \le 2\pi$$

e con l'equazione polare (nel caso a > b)

$$\rho = \frac{a\,b}{\sqrt{b^2\,\cos^2\phi + a^2\,\sin^2\phi}} = \frac{b}{\sqrt{1 - e^2\,\cos^2\phi}} \quad cone = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \ .$$

Il parametro e esprime la sua eccentricità e le ellissi si possono definire come le coniche con eccentricità compresa tra 0 e 1. V. a. Ellisse (wi), EFMR2D/ellipse/ellipse.shtml

G70b.04 circonferenza Luogo dei punti di uguale distanza, R, da un punto dato, $C = \langle x_C, y_C \rangle$ chiamato centro della circonferenza; quindi curva caratterizzata dall'equazione cartesiana

$$(x - x_C)^2 + (y - y_C) = R^2$$
 con $R \in \mathbb{R}_{0+}$.

Si tratta di un caso particolare dell'ellissi, quello relativo ad eccentricità nulla e all'equazione di secondo grado della forma

$$ax^2 + ay^2 + bx + cy + d = 0$$
.

4

MATeXp - Geometria

Essa è caratterizzata anche dalle seguenti equazioni

$$\begin{cases} x = x_C + R \cos t \\ y = y_C + R \sin t \end{cases} \quad \text{con } t \in [0, 2\pi] \quad , \quad \begin{cases} x = x_C + R \frac{1 - u^2}{1 + u^2} \\ y = y_C + R \frac{2u}{1 + u^2} \end{cases} \quad conu \in \mathbb{R} .$$

dove R_C è la distanza di C dall'origine e ϕ_C l'angolo tra l'asse orientato Ox e il segmento orientato

V.a. EFMR2D/cercle/cercle.shtml, Circonferenza (wi) e Circle (we)

G70b.05 iperbole Conica, discussa come tale in G50 e in particolare in G50d, fornita in una sua forma canonica dall'equazione cartesiana $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, con 0 < a < b. Si tratta di una curva che presenta due rami ed è invariante per riflessione rispetto ad Ox ed Oy (e per simmetria centrale). I suoi due rami sono rappresentabili con due sistemi di equazioni parametriche nelle quali entrano le funzioni seno e coseno iperbolico che da questo fatto traggono i loro nomi; le equazioni differiscono solo per il segno dell'ordinata e in effetti riguardano curve ottenibili per riflessione rispetto ad Oy:

$$\begin{cases} x = a \cosh t \\ y = b \sinh t \end{cases} \quad \text{per} \quad t \in \mathbb{R} \quad (\text{ramo destro}) \qquad \begin{cases} x = -a \cosh t \\ y = b \sinh t \end{cases} \quad pert \in \mathbb{R} \quad (\text{ramo sinistro}) \ .$$

G70 c. curve algebriche di grado 3

 $\mathsf{G70c.01}$ cubiche Curve che soddisfano un'equazione polinomiale di terzo grado nelle variabili cartesiane $x \in y$, cioè un'equazione della forma

$$ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3 + ex^2 + fxy + gy^2 + hx + iy + j = 0$$
.

Quindi le cubiche costituiscono uno spazio proiettivo di 9 dimensioni e si può trovare una cubica imponendo che essa passi per 9 punti assegnati. Si vedano anche https://en.wikipedia.org/wiki/Cubic plane curve e CubicCurve.html

G70c.02 versiera della Agnesi Cubica individuata dalle equazioni cartesiane

$$y(x^2 + a^3) = a^3$$
 con $a \in \mathbb{R}_+$ oppure $y = \frac{a^3}{x^2 + a^2}$.

Espressa anche da una parametrizzazione cartesiana e da una parametrizzazione polare:

$$\begin{cases} x = at \\ y = \frac{a}{1+t^2} \end{cases} \quad \text{per} \quad t \in \mathbb{R} \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} x = a \tan \phi \\ y = a \cos^2 \phi \end{cases} \quad \text{per} \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

Essa coincide sostanzialmente con la funzione di distribuzione lorentziana, ossia con la curva di risonanza. Presenta come asintoto l'asse Ox.

V.a. Versiera (wi), EFRM2D/agnesi/agnesi.shtml, 2dcurves/cubic/cubicr.html#witch of Agnesi

G70c.03 parabola semicubica o parabola di Neill Cubica la cui equazione cartesiana è

$$ax^3 - y^2 = 0$$

Nell'origine presenta una cuspide

V.a. EFMR2D/parabolesemicubic/parabolesemicubic.shtml, SC2 393

G70c.04 folium di Cartesio

$$\begin{cases} x = t(t-1) \\ y = t(t-1)2t - 1 \end{cases} \quad pert \in \mathbb{R} .$$

Curva illimitata intrecciata; passa due volte nell'origine, per t=0,1: si dice quindi che ha un punto doppio nell'origine; la trasformazione $\lceil t \leftrightarrow 1-t \rceil$ equivale alla sua riflessione rispetto ad Ox e ha l'effetto di cambiare il suo orientamento.

V.a Folium of Descartes (wi)

G70c.05 cissoide di Diocle Cubica individuata dalle seguenti equazioni

$$x^{3} + (x - a)y^{2} = 0$$
 ovvero $y^{2} = \frac{x^{3}}{2a - x}$,
 $\rho = 2a \tan \phi \sin \phi = a \left(\frac{1}{\cos \phi} - \cos \phi\right)$

o dalla parametrizzazione cartesiana razionale

$$\begin{cases} x = \frac{at^2}{1+t^2} \\ y = tx \end{cases}.$$

G70c.06 strofoide Cubica individuata dalla seguente equazione

$$\rho = b \frac{\sin(a - 2\phi)}{\sin(a - \phi)}$$

V.a. EFMR2D/strophoid/strophoid.shtml

G70c.07 strofoide diritta o strofoide di Newton Strofoide particolare relativa ad $a=\frac{\pi}{2}$ e quindi caratterizzata dall'equazione

$$\rho = b \, \frac{\cos 2\theta}{\cos \theta} \,\,,$$

ovvero dall'equazione cartesiana

$$(x+a)x^2 + (x-a)y^2 = 0$$
 con $a \in \mathbb{R}_+$ ovvero $y = \pm \sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$.

 $\mathsf{G70c.08}$ parabola divergente di Newton Classe di cubiche individuate dalla seguente equazione cartesiana

$$ay^{2} = x(x^{2} - 2bx + c)$$
 con $a \in \mathbb{R}_{+}, b, c \in \mathbb{R}$.

V.a. 2DCURVES/cubic/cubicn.html

G70c.09 serpentina o anguinea Cubica individuata dalle seguenti equazioni

$$y = \frac{a \, d \, x}{x^2 + d^2} \quad \text{con } a, d \in \mathbb{R}_+ \quad \text{ovvero} \quad x^2 \, y + \alpha \, \beta \, y - \alpha^2 \, x = 0 \quad con\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+$$

$$\rho^2 = \frac{\mathrm{d}}{\cos \phi} \left(\frac{a}{\sin \phi} - \frac{\mathrm{d}}{\cos \phi} \right) \,,$$

$$\begin{cases} x = d \, \tan \frac{t}{2} \\ y = \frac{a}{2} \sin t \end{cases} \quad \text{per} \quad \pi < t < \pi \quad \text{ovvero} \qquad \begin{cases} x = \alpha \, \cot t \\ y = \beta \, \sin t \, \cos t \end{cases}.$$

G70c.10 cubica di Tschirnhausen Cubica individuata dalle seguenti equazioni

$$27 a y^2 = x^2 (9a - x)$$
 ovvero $3 \alpha y^2 = x(x - \alpha)^2$
$$\begin{cases} x = 9a (1 - 3t^2) \\ y = t x \end{cases}$$

$$\rho = a \sec^3 \frac{\phi}{2}$$

V.a~EFMR2D/tschirnhausen/tschirnhausen.shtml

G70c.11 trisettrice di MacLaurin Cubica individuata dalle seguenti equazioni

$$y^{2}(a+x) = x^{2}(3a-x)$$
$$\rho = 2a \frac{\sin 3\phi}{\sin 2\phi}$$

V.a. Trisectrix of MacLaurin (we),

G70c.12 tridente di Newton o parabola di Cartesio Cubica individuata dalla seguente equazione

$$xy = cx^3 + dx^2 + ex + f$$

 $V.a.\ https://fr.wikipedia.org/wiki/Trident\ de\ Newton, http://FAMCUR/Trident.html, http://EFMR2D/trident/trident.shtml.$

G70c.13 concoide di de Sluze È la concoide di una retta, cioè la cubica individuata dall'equazione cartesiana

$$a(x+a)(x^2+y^2) = k^2 x^2 \quad \text{con } a \in \mathbb{R}_+$$
$$a(\rho \cos \phi + a) = k^2 \cos^2 \phi$$

V.a. Conchoid of de Sluze (we), FAMCUR/Conchoidsl.html

G70c.14 folium parabolico Cubica individuata dalle seguenti equazioni

$$x^{3} = a(x^{2} - y^{2}) + bxy \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}_{+}$$

$$\rho = \frac{a}{\cos \phi} - \tan \phi \frac{a \tan \phi - b}{\cos \phi} = \frac{a \cos 2\phi + \frac{b}{2} \sin 2\phi}{\cos^{3} \phi}$$

V.a. EFMR2D/foliumparabolic/foliumparabolic.shtml

G70c.15 ofiuride Cubica individuata dalle seguenti equazioni

$$x^{2}(x^{2} + y^{2}) = bxy - ay^{2}$$

$$\rho = a \cos \phi + b \sin \phi - \frac{a}{\cos \phi} = (b \cos \phi - a \sin \phi) \tan \phi$$

V.a. EFMR2D/ophiuride/ophiuride.shtml

G70c.16 cubica di Lamé Curva caratterizzata dall'equazione cartesiana

$$x^3 + y^3 = a^3$$

oppure da quella ottenibile con una rotazione di $-\frac{\pi}{4}$,

$$2Y^3 + 6YX^2 = \left(\sqrt{2}a\right)^3.$$

G70c.17 cissoidale di Zahradnik Curva caratterizzata dall'equazione polare

$$\rho = \frac{\mathrm{d}}{\cos \phi} + \frac{2a \, \cos \phi + 2b \, \sin \phi}{\alpha \, \cos^2 \phi + 2\beta \, \cos \phi \, \sin \phi + \gamma \sim^2 \phi} \ .$$

V.a. EFMR2D/cissoidaledezahradnik/cissoidaledezahradnik.shtml

G70c.18 trifoglio equilatero o trisettrice di de Longchamps Curva caratterizzata dalle seguenti equazioni

$$x(x^2 - 3y^2) = a(x^2 + y^2) \qquad \text{oppure} \qquad y = \pm \sqrt{\frac{x - a}{3x + a}}$$

$$\rho = \frac{a}{\cos 3\phi}$$

$$\begin{cases} x = a \frac{1 + t^2}{1 - 3t^2} \\ y = tx \end{cases}$$

V.a. EFMR2D/trefleequilatere/trefleequilatere.shtml

G70 d. curve algebriche di grado 4

 $\mathsf{G70d.01}$ quartiche Curve che soddisfano un'equazione polinomiale di quarto grado nelle variabili cartesiane x e y, cioè un'equazione con 15 parametri. Quindi le quartiche costituiscono uno spazio proiettivo di 14 dimensioni e si può trovare una quartica imponendo che essa passi per 14 punti assegnati.

V.a. Quartics (we), MW/QuarticCurve.html

G70d.02 concoidi Quartiche la cui equazione cartesiana è

$$(x^2 + y^2)(x - d)^2 - b^2x^2 = 0$$
 con $a, d \in \mathbb{R}_+$

Essa passa per l'origine

V.a. EFMR2D/conchoid/conchoid.shtml

 $\mathsf{G70d.03}$ concoide di Nicomede È la concoide di una retta, cioè la curva algebrica del quarto ordine individuata dall'equazione cartesiana

$$(x^2 + y^2 - ax)^2 - b^2(x^2 + y^2) = 0$$
 con $a, b \in \mathbb{R}_+$

V.a. EFMR2D/conchoiddenicomede/conchoiddenicomede.shtml

G70d.04 curva di Jerabek Curva caratterizzata da

$$(x^{2} + y^{2})(x - a)^{2} = k^{2}(x^{2} + y^{2} - ax)^{2}$$
$$\rho = s \frac{k \cos \phi - 1}{k - \cos \phi}$$

Si tratta di una concoide focale di conica dotata di centro.

V.a. EFMR2D/jerabek/jerabek.shtml

G70d.05 limaccia di Pascal o lumaca di Pascal o limaccia di Duerer È la concoide di una circonferenza, cioè la curva algebrica del quarto ordine la cui equazione cartesiana è

$$(x^2 + y^2 - ax)^2 - b^2(x^2 + y^2) = 0$$
 con

Essa viene anche individuata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = \cos^2 t + b \cos t \\ y = a \cos t \sin t + b \sin t \end{cases} \quad \text{con } 0 \le t \le 2\pi.$$

Essa inoltre può essere caratterizzata dall'equazione polare

$$\rho = a \cos \phi + b .$$

G70d.06 cardioide Curva algebrica del quarto ordine la cui equazione cartesiana è

$$(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - ax) - a^2y^2 = 0$$
 con $a \in \mathbb{R}_+$.

Essa viene anche individuata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = a \cos t (1 + \cos t) \\ y = a \sin t (1 + \cos t) \end{cases} \quad \text{con } 0 \le t \le 2\pi.$$

Essa inoltre può essere caratterizzata dall'equazione polare

$$\rho = a (1 + \cos \phi)$$
.

G70d.07 ovali di Cassini Curva algebrica del quarto ordine la cui equazione cartesiana è

$$(x^2 + y^2) - 2c^2(x^2 - y^2) - (a^2 - c^4) = 0$$
 con $a, c \in \mathbb{R}_+$.

G70d.08 ovali di Cartesio o curva aplanetica o optoide Curva algebrica del quarto ordine la cui equazione cartesiana è

$$((1-m^2)(x^2+y^2)+2m^2cx+a^2-m^2c^2)^2=4a^2(x^2+y^2)\ .$$

G70d.09 bicorno Quartica studiata da Sylvester e Cayley, la cui equazione cartesiana è

$$y^2(a^2 - x^2) - (x^2 + 2ay - a)^2 = 0$$
 ovvero $y = \frac{a^2 - x^2}{2a \pm \sqrt{a^2 - x^2}}$ con $a \in \mathbb{R}_+$.

Essa viene anche individuata dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = a \sin t \\ y = a \frac{\cos^2 t}{2 - \cos t} \end{cases} \quad \text{con } \pi \le t \le \pi .$$

Si tratta di una curva chiusa invariante per $((x \leadsto -x))$ dotata di due cuspidi nei punti $\langle \mp a, 0 \rangle$. V.a. Bicorn (we) e EFMR2D/bicorne/bicorne.shtml.

G70d.10 kampile di Eudosso Curva caratterizzata da

$$a^2x^4 - b^4(x^2 + y^2) = 0$$
$$\rho = \frac{b^2}{a\cos^2\theta}$$

V.a. EFMR2D/campyle/campyle.shtml, Kampyle of Eudoxus (we), FAMCUR/Kampyle.html

G70d.11 curva kappa o curva di van Gutschoven Curva caratterizzata da

$$y^{2}(x^{2} + y^{2}) = a^{2} x^{2}$$
$$\rho = a \cot \theta$$

Segnaliamo anche Curva kappa (wi) e http://AMCUR/Kappa.html

G70d.12 perle di de Sluze Curve caratterizzate da

$$y^n = k(a-x)^p x^m$$

V.a. FAMCUR/Pearls.html

G70d.13 curva del diavolo

$$y^4 - x^4 + ay^2 + bx^2 = 0$$
$$r = 4a \cos\theta \sin^2\theta$$

V.a. FAMCUR/Devils.html, Devil's curve (we), EFMR2D/diable/diable.shtml

G70d.14 folium doppio o bifolium Curva caratterizzata da

$$(x^2 + y^2)^2 = 4axy^2$$

V.a. EFMR2D/bifolium/bifolium.shtml

G70d.15 conchiglie di Duerer Curva caratterizzata da

$$(x^2 + xy + ax - b^2)^2 = (b^2 - x^2)(x - y + a)^2$$

V.a. FAMCUR/Durers.html

G70d.16 curva a forma di otto o lemniscata di Gerono Curva caratterizzata da

$$x^4 = a^2(x^2 - y^2)$$

$$\rho^2 = a^2 \cos 2\phi \sec^4\phi$$

Oppure

$$(x^{2} + y^{2})^{2} = a^{2}(x^{2} - y^{2})$$
$$\rho^{2} = a^{2} \cos 2\phi$$

V.a. EFMR2D/gerono/gerono.shtml

G70d.17 quartica piriforme Curva caratterizzata da

$$b^2 y^2 = x^3 (a - x) .$$

FAMCUR/Pearshaped.html

G70d.18 quartica pisello Curva caratterizzata da

$$x^4 + x^2y^2 + y^4 = x(x^2 + y^2)$$
.

G70d.19 curva bicuspide Curva caratterizzata da

$$(x^2 - a^2)(x - a)^2 + (y^2 - a^2)^2 = 0$$
 per $a \in \mathbb{R}_+$.

Simmetrica rispetto ad Ox, presenta due cuspidi in $\langle a, \pm a \rangle$.

V.a. MW/BicuspidCurve.html

G70d.20 quartica staffa Curva caratterizzata da

$$(x^2 - 1)^2 = y^2(y - 1)(y - 2)(y + 5)$$

V.a. MW/StirrupCurve.html

 $\mathsf{G70d.21}$ curva di Trott Curva caratterizzata da

$$144(x^4 + y^4) - 225(x^2 + y^2) + 350x^2y^2 + 81 = 0$$

V.a. Bitangents of a quartic (we)

G70d.22 curva crociforme Curva caratterizzata da

$$x^2 + y^2 - x^2 y^2 = 0$$

$$\begin{cases} x = \frac{\sin t}{h} & \text{con } t \in [0, 2\pi] . \\ y = 1 + \cos t & \end{cases}$$

G70d.23 quartica di Juel Curva caratterizzata da

$$(x^2 - y^2)^2 = a^2 x^2 - b^2 y^2 \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}_+$$

$$\rho = \frac{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta - b^2 \sin^2 \theta}}{\cos 2\theta}$$

V.a. EFMR2D/alain/alain.shtml

G70d.24 ippopede di Proclo o lemniscata di Booth Curva caratterizzata da

$$(x^{2} + y^{2})^{2} + 4b(b - a)(x^{2} + y^{2}) = 4b^{2}x^{2} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}_{+}$$
$$\rho^{2} = 4b(a - b\sin^{2}\theta)$$

Essa si può anche caratterizzare come sezione spirica relativa a un piano secante parallelo all'asse del toro. È evidentemente simmetrica per riflessione rispetto ad Ox e rispetto ad Oy. Se b=2a coincide con la lemniscata di Jacques Bernoulli.

V.a. EFMR2D/booth/booth.shtml

G70d.25 curva a punta di pallottola Curva caratterizzata da

$$a^2 y^2 - b^2 x^2 = x^2 y^2$$

V.a Bullet-nose curve (we)

G70d.26 tricuspide o deltoide Curva caratterizzata da

$$(x^{2} + y^{2})^{2} - 8x(x^{2} - 3y^{2}) + 18(x^{2} + y^{2}) - 27 = 0$$

$$\begin{cases} x = 2 \cos t + \cos 2t \\ y = 2 \sin t - \sin 2t \end{cases}$$

V.a. EFMR2D/deltoid/deltoid.shtml

G70d.27 lemniscata di Jacques Bernoulli Curva caratterizzata da

$$(x^{2} + y^{2})^{2} = a^{2}(x^{2} - y^{2})$$

$$\begin{cases}
x = a \frac{\sin t}{1 + \cos^{2} t} \\
y = a \frac{\sin t \cos t}{1 + \cos^{2} t}
\end{cases}$$

$$a^{2} = a^{2} \cos 2\theta \quad \text{dove } \tan \theta = \cos t.$$

G70d.28 sezioni spiriche o spiriche di Perseo Quartiche individuate dall'equazione cartesiana

$$(x^2 + y^2)^2 = dx^2 + ey^2 + f$$

Particolari sezioni spiriche sono gli ovali di Cassini e la lemniscata di Bernoulli.

V.a. EFMR2D/spiricdeperseus/spiricdeperseus.shtml

MATeXp – Geometria

G70 e. curve algebriche di grado 5

G70e.01 quintiche Curve caratterizzate da

V.a. MW/QuinticCurve.html

G70e.02 curva di Burnside Curva caratterizzata da

$$y^2 - x(x^4 - 1) = 0$$

V.a. MW/BurnsideCurve.html

 $G70e.03 \ \ \text{quintica di de l'Hopital} \ \ \mathrm{Curva\ caratterizzata\ da}$

$$\begin{cases} x = \frac{a}{2} \left(\frac{u - u^5}{5} \right) \\ y = \frac{a}{4} (1 + u^2)^2 \end{cases}.$$

Alberto Marini

G70 f. curve algebriche di grado 6

G70f.01 sestiche Curve caratterizzate da

V.a. MW/SexticCurve.html, EFMR2D/sextic/sexticrationnelle.shtml

G70f.02 astroide Curva chiusa definita in una sua forma canonica dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases} \quad \text{per} \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

Essa si può ottenere in forma implicita cartesiana con l'equazione $x^{2/3}+y^{2/3}=a^{2/3}$. Essa si può anche definire come ipocicloide a quattro cuspidi, ossia essa si può ottenere cinematicamente come traccia di un punto di una circonferenza di raggio a/4 che viene fatta rotolare all'interno di una circonferenza di raggio a; per tale motivo essa viene chiamata anche **tetracuspide**.

Questa curva ha come centro l'origine ed è invariante per le riflessioni rispetto ad Ox e rispetto ad Oy. Essa è regolare in tutti i suoi punti a eccezione delle quattro cuspidi poste nei punti $\langle \pm 1, 0 \rangle$ e $\langle 0, \pm 1 \rangle$. Segnaliamo inoltre Astroide (wi) e http://XAHLEE/Astroid_dir/astroid.html.

G70f.03 nefroide di Freeth Strofoide individuata dall'equazione polare

$$\rho = a \left(1 + 2\sin\frac{\phi}{2} \right) \quad \text{con } a \in \mathbb{R}_+$$

V.a. FAMCUR/Freeths.html

G70f.04 atriftaloide o curva atriftotlassica Curva caratterizzata da

$$x^{4}(x^{2} + y^{2}) - (ax^{2} - b)^{2} = 0$$
 dove $A, b \in \mathbb{R}_{+}$

V.a. MW/Atriphtaloid.html

G70f.05 quadrifoglio o rosa a 4 petali Curva caratterizzata da

$$(x^2 + y^2)^3 = (x^2 - y^2)^2$$

 $\rho = \cos 2\phi$

V.a. EFMR2D/trefle/trefle.shtml, Quadrifolium (we)

G70f.06 sestica di Cayley Curva algebrica di grado 6 la cui equazione cartesiana è

$$4(x^2 + y^2 - ax)^3 = 27a^2(x^2 + y^2)^2.$$

G70f.07 cornoide Curva caratterizzata da

$$-4a^6 + 3a^2x^4 + x^6 + 8a^4y^2 - 6a^2x^2y^2 + 3x^4y^2 - 5a^2y^4 + 3x^2y^4 + y^6 = 0$$
 con $a \in \mathbb{R}_+$.

Essa viene anche individuata dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = a \cos t(1 - 2 \sin^2 t) \\ y = a \sin t(1 + 2 \cos^2 t) \end{cases} \quad \text{con } a \in \mathbb{R}_+ \ .$$

G70f.08 cicloide di Ceva Curva caratterizzata da

$$(x^2 + y^2)^3 = (3x^2 - y^2)^2$$

$$\rho = 1 + 2\cos 2\phi$$

V.a. MW/CycloidofCeva.html

G70f.09 curva di Talbot Curva caratterizzata da

$$\begin{cases} x = (a^2 + f^2 \sin t) \frac{\cos t}{a} \\ Y = (a^2 - 2f^2 + f^2 \sin t) \frac{\sin t}{b} \end{cases}$$

V.a. MW/TalbotsCurve.html

G70f.10 scarabeo Curva caratterizzata da

$$(x^{2} + y^{2})(x^{2} + y^{2} + ax)^{2} - b^{2}(x^{2} - y^{2})^{2} = 0 \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}_{nz}$$

$$\rho = b \cos 2\phi - a \cos \phi \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}_{nz}$$

V.a. MW/Scarabaeus.html

G70f.11 farfalla sestica Curva caratterizzata da

$$y^6 = x^2 - x^6$$

G70f.12 sestica manubrio Curva caratterizzata da

$$a^4y^2 = a^2 x^4 - x^6$$

V.a. MW/DumbbellCurve.html

G70f.13 sestica cuore Curva caratterizzata da

$$a^4 y^2 = a^2 x^4 - x^6$$

V.a. MW/HeartCurve.html

$$\begin{cases} x = \frac{a^2 - b^2}{a} \cos^3 t \\ y = \frac{b^2 - a^2}{b} \sin^3 t \end{cases}$$

o dall'equivalente equazione cartesiana

$$(a x)^{2/3} + (b y)^{2/3} = (a^2 - b^2)^{2/3}$$

V.a. MW/EllipseEvolute.html

G70f.15 evoluta di limaccia di Etienne Pascal La limaccia definita dalla equazione polare $\rho = b + a \cos \phi$ ha come evoluta la curva data dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = \frac{a \left[4a^2 + 4b^2 + 9ab\cos t - ab\cos 3t \right]}{4(2a^2 + b^2 + 3ab\cos t)} \\ y = \frac{a^2 b \sin^3 t}{2a^2 + b^2 + 3ab\cos t} \end{cases}$$

Alberto Marini

G70f.16 curva di Watt Curva caratterizzata da

$$\rho^2 = b^2 - \left[a \, \sin \phi \pm \sqrt{c^2 - a^2 \, \cos^2 \phi} \right]^2 \; .$$

 $V.a.\ EFMR/courbes 2D/watt/watt.shtml$

G70f.17 curva della bocca o curva del bacio Curva caratterizzata da

$$a^4 y^2 = (a^2 - x^2)^3$$

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}.$$

G70f.18 trisettrice di Ceva Curva caratterizzata da

$$(x^2 + y^2)^3 = a^2 (3x^2 - y^2)^2$$
,
 $\rho = a (1 + 2 \cos 2\phi) = a \frac{\sin 3\phi}{\sin \phi}$.

G70 g. curve algebriche di grado 7 e 8

 $\begin{tabular}{ll} $\sf G70g.01$ & settiche & Curve caratterizzate da \\ V.a. & EMFR/courbes 2d/septic/septic.shtml \\ \end{tabular}$

 $\begin{tabular}{ll} $\sf G70g.02$ & biquadriche & Curve caratterizzate da \\ V.a. & EMFR/courbes2d/biquartic/biquartic.shtml \\ \end{tabular}$

G70g.03 toroidi Curve parallele all'ellisse: la parametrizzazione cartesiana del toroide parallele all'ellissi caratterizzata da $\begin{cases} x=a\cos t\\ y=a\sin t \end{cases}$ che presenta la distanza d e

$$\begin{cases} x = \left(a \pm \frac{bd}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}\right) \cos t \\ y = \left(b \pm \frac{ad}{\sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}}\right) \sin t \end{cases}$$

Esse danno il contorno apparente di una superficie torica.

V.a. EMFR/courbes2d//toroid/toroid.shtml

G70g.04 ovali di Cayley Curve caratterizzate da V.a. EMFR/courbes2d/cayleyovale/cayleyovale.shtml

G70g.05 cuore di Raphael Laporte Curva caratterizzata da V.a. EMFR/courbes2d/ornementales/ornementales.shtml

G70 h. famiglie con curve algebriche di gradi diversi

G70h.01 curve di Lissajous o curve di Bowditch Curve caratterizzate da

$$\begin{cases} x = a \frac{\sin(m+n)t}{\sin(m-n)t} \\ y = b \sin t \end{cases}$$

 $V.a.\ Lissajous\ curve\ (we)$

G70h.02 curve rodonee Curve caratterizzate da

$$\rho = a \sin(q \, \phi) \quad \text{con} \quad q \in \mathbb{Q}_+$$

Se k = 2h + 1 è un intero dispari la curva si dice rosa a 2h + 1 petali; se k = 2h è un intero pari la curva si dice rosa a 4h petali.

V.a. Rhodonea curve (we), MW/Rose.html

 $\mathsf{G70h.03}$ curve di Lamé o superellissi Curve caratterizzate da

$$\left|\frac{x}{a}\right|^r + \left|\frac{y}{b}\right|^r = 1 \quad \text{con } a, b, r \in \mathbb{R}_+$$

$$\begin{cases} x = a \cos^{2/r} t \\ y = b \sin^{2/r} t \end{cases}$$

V.a. Superellipse (we), MW/Superellipse.html

 $\mathsf{G70h.04}$ folioide Curva caratterizzata dall'equazione polare

$$\rho^2 + b^2 - 2b\rho \cos n\phi = a^2 \quad \text{con } a, b, n \in \mathbb{R}_+$$

o dalla equivalente

$$\rho = a \left(e \cos n\phi \pm \sqrt{1 - e^2 \sin^2 n\phi} \right) \quad \text{dove} \quad e = \frac{b}{a}.$$

G70 i. cicloidi, epicicloidi e ipocicloidi

G70i.01 cicloide Curva periodica illimitata individuata dalla parametrizzazione cartesiana

(1)
$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases} \text{ per } t \in \mathbb{R}.$$

Si tratta di una rulletta e si può ottenere meccanicamente come curva tracciata da un punto fissato su una circonferenza di raggio a che viene fatta rotolare sopra una retta Ox. Si tratta di una curva periodica di periodo 2π il cui diagramma è invariante per traslazioni orizzontali di passo $2\pi a$.

Per prima salita della cicloide si intende la curva aperta limitata caratterizzata dalle equazioni (1) limitando la variabile indipendente $t \in [0, \pi]$. Le (1) mostrano che il diagramma della prima salita , al crescere della t da 0 a π vede crescere la x da 0 ad $a\pi$ e la y da 0 a 2 a. L'arco di cicloide relativo a $t \in [\pi, 2\pi]$ si ottiene dalla prima salita per riflessione rispetto alla retta $x = \pi a$

La prima salita della cicloide si caratterizza facilmente con l'equazione cartesiana ottenuta sostituendo la t nella prima equazione (1) con l'espressione $t = \arccos\left(1 - \frac{y}{a}\right)$ equivalente alla seconda equazione, cioè con l'espressione

(2)
$$x = a \arccos\left(1 - \frac{y}{a}\right) - \sqrt{2ay - y^2} .$$

Chiaramente la cicloide è regolare per ogni x reale a eccezione delle ascisse $k a \pi$ per $k \in \mathbb{Z}$ in ciascuno dei quali presenta una cuspide.

Per l'area delimitata da un'arcata della cicloide, a es. di quella corrispondente a $0 \le x \le 2\pi$, si trova (SC2 190) che vale $3\pi a^2$.

Inoltre vanno segnalati http://EFMR2D/cycloid/cycloid.shtml, Cicloide (wi) e Tautochrone curve (we).

G70i.02 epitrocoide

$$\begin{cases} x = (a+b)\cos t - c\cos((a/b+1)t) \\ y = (a+b)\sin t - c\sin((a/b+1)t) \end{cases}$$

V.a. EFMR2D/epitrochoid/epitrochoid.shtml

 $\mathsf{G70i.03}$ brachistocrona $\grave{\mathrm{E}}$ la curva riflessa rispetto ad Ox della cicloide.

V.a. Brachistochrone (we)

G70 j. spirali

G70j.01 Le spirali sono curve dotate di punti asintotici e di conseguenza non sono curve algebriche, ma curve trascendenti.

V.a. Spiral (we)

G70j.02 spirale di Archimede

$$\rho = a + b \, \phi$$

V.a. EFMR2D/archimede/archimede.shtml

G70j.03 spirale iperbolica

$$\rho = \frac{a}{\phi} \quad \text{per} \quad \phi \in \mathbb{R}_{nz} \quad \text{e} \quad a \in \mathbb{R}_{+} .$$

G70j.04 spirale logaritmica o spirale equiangolare o spirale di Jacques Bernoulli

$$\rho = a \exp(\phi \cot b)$$

V.a. Spirale logaritmica (wi)

G70j.05 spirale sinusoidale

$$\rho^{\nu} = 2 a^{\nu} \cos \nu \phi \quad \text{per} \quad \nu \in \mathbb{R} , \ a \in \mathbb{R}_{+}$$

V.a. EFMRcourbes2d/spiralesinusoidale/spiralesinusoidale.shtml

G70j.06 spirale di Fermat

$$\rho^2 = a^2 \phi \quad \text{per} \quad a \in \mathbb{R}_+$$

V.a. Fermat's_spiral (we), MW/FermatsSpiral.html

G70j.07 lituo

$$\rho^2 = \frac{a^2}{\phi} \quad \text{per} \quad a \in \mathbb{R}_+$$

V.a. Lituus.html

G70j.08 involuta della circonferenza

$$\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

G70j.09 clotoidi o spirali di Cornu o spirale di Eulero o spirale di Nielsen Curva individuata dalle equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = a\sqrt{\pi} \int_0^t du \cos\left(\frac{\pi u^2}{2}\right) \\ y = a\sqrt{\pi} \int_0^t du \sin\left(\frac{\pi u^2}{2}\right) \end{cases} \quad \text{con } a \in \mathbb{R}_+ \quad \text{per} \quad t \in \mathbb{R} .$$

La forma delle precedenti equazioni implica che essa presenti un centro di simmetria nell'origine O, punti appartenenti al primo quadrante e punti appartenenti al terzo quadrante. Inoltre essa presenta due punti asintotici, $A = \left\langle \frac{a\sqrt{\pi}}{2}, \frac{a\sqrt{\pi}}{2} \right\rangle$ e $-A = \left\langle -\frac{a\sqrt{\pi}}{2}, -\frac{a\sqrt{\pi}}{2} \right\rangle$.

Detto P(t) il suo punto corrente e posto $s:=a\sqrt{\pi}\,t$, tale parametro esprime la lunghezza dell'arco da O a P se questo punto sta nel primo quadrante e l'opposto di tale lunghezza sse P sta nel terzo quadrante La spirale di Eulero è caratterizzata dal fatto che la sua curvatura 1/r nel punto corrente P è proporzionale a |s|: $\frac{1}{r}=\frac{s}{a^2}$. V.a. Euler spiral (we)

G70j.10 spirale SiCi

$$\begin{cases} x = -a \operatorname{Ci}(t) = a \int_{t}^{+\infty} du \frac{\cos u}{u} \\ y = a \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Si}(t)\right) = a \int_{t}^{+\infty} du \frac{\sin u}{u} \end{cases}$$
 dove $a \in \mathbb{R}_{+}$

In queste formule compaiono le funzioni seno integrale e coseno integrale:

$$Si(x) := \int_0^x dt \frac{\sin t}{t}$$
, $Ci(x) := \gamma_{em} + \ln x + \int_0^x dt \frac{\cos t - 1}{t}$.

V.a. EFMR2D/sici/sici.shtml, Trigonometric integral (we)

G70j.11 spirale trattrice Curva caratterizzata dalla parametrizzazione polare

$$\begin{cases} \rho = a \cos t \\ \phi = \tan t - t \end{cases} \quad \text{per} \quad -\pi < t < \pi$$

oppure dall'equazione polare

$$\phi = \pm \left(\frac{\sqrt{a^2 - \rho^2}}{\rho} - \arccos\frac{\rho}{a}\right) \quad \text{dove} \quad a \in \mathbb{R}_+$$

V.a. EFMR2D/spiraletractrice/spiraletractrice.shtml

G70j.12 spirali di Poinsot Famiglia di curve caratterizzata dalla equazione polare

$$\rho = \frac{a}{c \cosh k\phi + s \sinh k\phi} \quad \text{con } a, c, s \in \mathbb{R} , \ c^2 + s^2 > 0$$

Se |c|=|s| si ha una spirale logaritmica; se |c|>|s| si hanno spirali che si avvicinano alla spirale limitata caratterizzata dall'equazione $\rho=b\operatorname{csch}\,k\phi$; se |c|<|s| si hanno spirali che si avvicinano alla spirale dotata di asintoto data dalla $\rho=b\operatorname{sech}k\phi$.

V.a. EFMR2D/poinsot/poinsot.shtm

 $\mathbf{21}$

G70 k. altre curve trascendenti

G70k.01 catenaria Curva costituente il diagramma della funzione

$$y = \cosh x = \frac{\mathsf{e}^x + \mathsf{e}^{-x}}{2} \ .$$

Si segnalano anche [Catenaria (wi), Catenary (we) e http://EFMR2D/chainette/chainette.shtml.

G70k.02 catenaria elastica Curva caratterizzata dalle due seguenti parametrizzazioni cartesiane equivalenti

$$\begin{cases} x = a \left(\operatorname{arsinh} t + k t \right) \\ y = a \left(\sqrt{1 + t^2} + \frac{k}{2} t^2 \right) \end{cases}, \begin{cases} x = a \left(u + k \sinh u \right) \\ y = a \left(\cosh u + \frac{k}{2} \sinh^2 u \right) \end{cases} \quad \operatorname{con} a, k \in \mathbb{R}_+ \end{cases}, \quad t = \sinh u$$

V.a. EFMR2D/chainette/chainetteelastique.shtml

G70k.03 distribuzione normale degli errori

$$y = \sqrt{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

V.a. Curva degli errori (wi), Normal distribution (we).

G70k.04 trattrice Curva individuata dall'equazione cartesiana

$$x^{2} = \left[a \operatorname{arcosh}\left(\frac{a}{y}\right) - \sqrt{a^{2} - y^{2}} \right]^{2} \quad \text{con } a \in \mathbb{R}_{+} .$$

Si tratta quindi di una curva pari che per x crescente da 0 a $+\infty$ decresce dal massimo in $\langle 0, a \rangle$ a 0, ammettendo Ox come asintoto orizzontale. Essa in $\langle 0, a \rangle$ presenta una cuspide con tangente verticale. Essa è caratterizzata dal fatto che la sua tangente in un suo qualsiasi punto P interseca Ox in un punto T tale che PT=a.

V.a. Trattrice (geometria) (wi)

G70k.05 sintrattrice Curva individuata dall'equazione cartesiana

$$x + \sqrt{b^2 - y^2} = a \ln \frac{b + \sqrt{b^2 - y^2}}{y}$$

V.a. Syntractrix (we)

G70k.06 farfalla Curva caratterizzata dall'equazione polare

$$\rho = e^{\sin \phi} - 2 \cos 4\phi) + \sin^5 \left[\frac{1}{24} (2\phi - \pi) \right]$$

o dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = \sin t \left[e^{\cos t} - 2 \cos 4t + \sin^5 \frac{t}{12} \right] \\ y = \cos t \left[e^{\cos t} - 2 \cos 4t + \sin^5 \frac{t}{12} \right] \end{cases}$$

G70k.07 cocleoide Curva caratterizzata da

$$\rho = a \, \frac{\sin \phi}{\phi}$$

$$(x^2 + y^2) \arctan \frac{y}{x} = ay$$

Essa viene anche individuata dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = \frac{a \sin t \cos t}{t} \\ y = \frac{a \sin^2 t}{t} \end{cases} \quad \text{con} \quad .$$

G70k.08 quadratrice di Abdank-Abakanowicz Curva individuata dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = a \sin t \\ y = \frac{a^2}{2} (t + \sin t \cos t) \end{cases} \quad \text{con } a \in \mathbb{R}_+ .$$

G70k.09 alisoide di Cesaro Curva caratterizzata da

$$\begin{cases} x = k^2 a \int_0^t du \frac{\cos u}{\cos^2 k u} \\ y = k^2 a \int_0^t du \frac{\sin u}{\cos^2 k u} \end{cases} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}_+ , \ k := \frac{b}{a} .$$

G70k.10 curva balistica o parabola smorzata Curva caratterizzata da

$$y = \frac{b}{a}x + c\,\ln\left(1 - \frac{x}{a}\right) \ .$$

G70k.11 curve di Joseph Plateau Curve caratterizzate da

$$\begin{cases} x = a \frac{\sin(nt+c)}{\sin(m-n)t} \\ y = 2a \frac{\sin mt \sin nt}{\sin(m-n)t} \end{cases}$$

Evidentemente sono curve simmetriche rispetto ad Ox

V.a. MW/PlateauCurves.html

G70k.12 quadratrice di Ippia o trisettrice di Ippia o quadratrice di Dinostrato Curva caratterizzata da

$$y = x \cot\left(\frac{\pi x}{2a}\right)$$
$$\rho = \frac{2a\phi}{\pi \sin\phi}$$

 $V.\ a.\ FAMCUR/Quadratrix.html,\ EFMR2D/dinostrate/dinostrate.shtml,$

XAHLEE_dir/QuadratrixOfHippias_dir/quadratrixOfHippias.html

G70k.13 sezioni toriche Per sezione torica si intende una curva piana ottenuta come intersezione di un toro con un piano. Quando il piano secante è parallelo all'asse di simmetria cilindrica del toro si hanno curve dell'insieme delle sezioni spiriche.

V.a. MW/ToricSection.html

G70k.14 curva cuore di Dascanio Essa viene individuata dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = \sin t \cos t \ln |t| \\ y = |t|^{3/10} \sqrt{\cos t} \end{cases} \quad \text{con} .$$

G70k.15 curva cuore di Kuriscak

$$x^{2} + \left[y + \frac{2(x^{2} + |x| - 6)}{3(x^{2} + |x| + 2)}\right]^{2} = 36$$

V.a. MW/HeartCurve.html

G70k.16 curva piriforme Caratterizzata dalla parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = \frac{\sin t}{h} \\ y = 1 + \cos t \end{cases} \quad \text{con } t \in [0, 2\pi] , h \in [2, +\infty) .$$

G70k.17 curva di Joukovski o ala d'aeroplano

V.a. EFMR2D/joukowski/joukowski.shtml

G70k.18 curva della mascotte Curva definita cinematicamente dalle equazioni

$$\begin{cases} x = V_0 t + R \cos \phi \\ y = R \sin \phi \end{cases} \quad e \quad \frac{d\phi}{st} = \omega_0 \left(\sin \phi + \sqrt{k^2 - \sin^2 \phi} \right)$$

$$\mbox{dove} \quad V_0, V, R \in \mathbb{R}_+ \ , \ \omega_0 := \frac{V_0}{R} \ , \ k := \frac{V}{V_0}$$

Queste portano alla traiettoria avente come parametrizzazione cartesiana

$$\begin{cases} x = R \left(\cos \phi + \int_0^\phi \frac{\mathrm{d}\psi}{\sin \psi + \sqrt{k^2 - \sin^2 \psi}} \right) \\ y = R \sin \phi \end{cases}.$$

G70k.19 settrice di MacLaurin o settrice di Plateau o curva isociclotomica Luogo dei punti in cui si intersecano due rette che ruotano la prima, \mathcal{R}_O , intorno all'origine O con velocità angolare ω , la seconda, \mathcal{R}_a , intorno al punto $A = \langle a, 0 \rangle$ con velocità angolare $k \omega$, essendo ϕ_0 l'angolo formato dalle due rette quando \mathcal{R}_O passa per A (ed è orizzontale. La curva è caratterizzata dall'equazione polare con centro nell'origine

$$\rho = a \frac{\sin(\phi_0 + k\phi)}{\sin(\phi_0 + (k-1)\phi)}.$$

Alternativamente dall'equazione polare con centro in A

$$\sigma = a \frac{\sin \frac{\psi}{k}}{\sin \left(\phi_0 + \left(1 - \frac{1}{k}\right)\psi\right)}.$$

Scambiare k con $\frac{1}{k}$ equivale a scambiare O e A. Se k=2 o $k=\frac{1}{2}$ la settrice è una circonferenza; se k=-1 la retta asse di simmetria per riflessione del segmento OA; se k=3 si ha la trisettrice di MacLaurin.

V.a. http://EFMR2D/sectrice/sectricedemaclaurin.shtml

G70k.20 curva dei meandri o curva generata dal seno

$$\begin{cases} x = a \int_0^t du \cos(\phi_m ax \sin u) \\ y = a \int_0^t du \sin(\phi_m ax \sin u) \end{cases}.$$

MATeXp – Geometria

 $\mathsf{G70k.21}$ curva elastica Curva tale che la sua curvatura in ogni suo punto P è proporzionale alla sua distanza da una data retta; questa retta è chiamata direttrice della curva.

$$\begin{cases} x = a \sqrt{k + \cos t} \\ y = \frac{a}{2} \int_0^t du \frac{\cos u}{\sqrt{k + \cos u}} \end{cases}.$$

G70 I. curve ricavate da altre curve

G701.01 curve isottiche Per curva isottica d'angolo α di una data curva Γ si intende il luogo dei punti dai quali si possono tracciare due tangenti alla Γ che delimitano un angolo di ampiezza α . V.a~EFMR2D/isoptic/isoptic.shtml

G701.02 rullette e curve cicloidali Per rulletta si intende una curva piana ottenibile meccanicamente a partire da due curve piane regolari date, una M mobile che chiameremo **curva rotolante** e una fissa G che diremo curva guida; la M deve essere una curva chiusa e denotiamo con I_M l'insieme ottenuto ampliando M con i punti del suo interno; la G può essere sia aperta che chiusa e in genere non è intrecciata. La curva M viene fatta rotolare senza strisciare a contatto di un lato della curva G (questo pone restrizioni alle curvature di $M \in G$). Una rulletta si ottiene come traccia di un punto stabilito T fissato rigidamente ad Mo ad I_M .

Per curva cicloidale si intende una rulletta avente come curva mobile M una circonferenza. Viene tracciata: una cosiddetta curva cicloidale propria sse il punto tracciante T appartiene ad M; una curva cicloidale contratta sse T è punto interno ad M; una curva cicloidale estesa sse T è esterno ad I_M . Le curve cicloidali contratte ed estese sono chiamate anche trocoidi.

V.a. EFMR2D/trochoid/trochoid.shtml

G701.03 podaria o pedale Data una curva Γ e un punto P, si dice podaria della Γ rispetto al polo Pl'insieme dei punti x individuati come proiezioni ortogonali di P sulle diverse rette tangenti t alla Γ ; il punto $\mathbf{x}(\mathbf{t})$ viene chiamato anche piede di P sulla \mathbf{t} .

Se Γ è data dalla parametrizzazione cartesiana $\begin{cases} X = F(t) \\ Y = G(t) \end{cases}, \text{ la tangente } \mathbf{t}(t) \text{ alla } \Gamma \text{ in } \left\langle F(t), G(t) \right\rangle \text{ ha}$ equazione $\begin{vmatrix} \| y - G(t) \\ G'(t) \end{vmatrix} = \frac{x - F(t)}{F'(t)} \|.$

equazione
$$\frac{\|y - G(t)\|}{G'(t)} = \frac{x - F'(t)}{F'(t)}$$

La proiezione di $P = \langle x_P, y_P \rangle$ sulla $\mathbf{t}(t)$ si trova sulla perpendicolare alla tangente che passa per P, cioè sulla $\left| \frac{y - y_P}{F'(t)} = -\frac{x - x_P}{G(t)} \right|$.

Di conseguenza il punto generico della podaria è dato da

$$\begin{cases} x = \frac{x_P F'^2(t) + (y_P - G(t)) F'(t) G'(t) + F(t) G'^2(t)}{F'^2(t) + G'^2(t)} \\ y = \frac{G(t) F'^2(t) + (x_P - F(t)) F'(t) G'(t) + y_P F'^2(t)}{F'^2(t) + G'^2(t)} \end{cases}$$

V.a. EFMR2D/podaire/podaire.shtml

G701.04 antipodaria o ortocaustica Si dice antipodaria di una curva Γ rispetto al punto P, chiamato polo, la curva G tale che Γ è la podaria della G rispetto a PV.a. EFMR2D/antipodaire/antipodaire.shtml

G701.05 inviluppo Si consideri una famiglia a un parametro τ di curve piane $\mathbf{F} = \{\tau \in T : | \Gamma_{\tau}\}$; si dice inviluppo di tale famiglia il luogo dei punti caratteristici di tali curve, cioè il luogo costituito dai punti di intersezione di $\Gamma \tau$ e $\Gamma_{\tau'}$ per $\tau' \to \tau$.

La curva inviluppo di una famiglia \mathbf{F} è tangente a ciascuna delle curve Γ_{τ} e in linea di massima ogni curva Γ_{τ} è tangente in almeno un punto alla curva inviluppo.

MATeXp – Geometria

V.a. EFMR2D/enveloppe/enveloppe.shtml

 $\mathsf{G70I.06}$ evoluta di una curva Γ è il luogo dei suoi centri di curvatura.

V.a. EFMR2D/developpee/developpee.shtml

G70I.07 caustica

V.a. EFMR2D/caustic/caustic.htm

G70I.08 curva ortotomica

V.a. EFMR2D/orthotomic/orthotomic.shtml

G701.09 anticaustica

V.a. EFMR2D/anticaustic/anticaustic.shtml

G70I.10 reciproca polare

G70l.11 cissoidale Date due curve Γ_1 e Γ_2 , si dice cissoidale di tali curve rispetto a un punto P il luogo dei punti M tali che $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PM_1} + \overrightarrow{PM_2}$, dove M_1 è un punto generico di Γ_1 , M_2 è il corrispondente punto di Γ_2 allineato con P ed M_1

V.a. EFMR2D/cissoidale/cissoidale.shtml

Alberto Marini

G70 m. altre collezioni di curve

$\mathsf{G70m.01}$ curva autoparallela o curva orbiforme o curva di larghezza costante

Curva connessa parallela a se stessa.

 $V.a.\ EFMR2D/largeur\%20 constante/largeur\%20 constante. shtml$

G70m.02 curve di inseguimento

$$y = cx^2 - \ln x \quad \text{con } c \in \mathbb{R}_+$$

 $V.a.\ FAMCUR/Pursuit.html$

G70m.03 curva anallagmatica

V.a. EFMR2D/anallagmatic/anallagmatic.shtml

G70 n. indice KWIC dei nomi di curve piane

Α

Abdank-Abakanowicz , quadratrice di : :k.08
aeroplano , ala d' : :k.18
Agnesi , versiera della : c02
ala d'aeroplano : :k.18
alisoide di Cesàro : :k.09
anallagmatica , curva : :m.03
anguinea : c09
anticaustica : :l.09
antipodaria : :l.04
aplanetica , curva : :d.08
Archimede , spirale di : :j.02
astroide : :f.02
atriftaloide : :f.04
autoparallela , curva : :f.04
autoparallela , curva : :m.01

В

bacio , curva del : :f.17

balistica , curva : :k.10

Bernoulli , lemniscata di Jacques : :d.27

Bernoulli , spirale di Jacques : :j.04

bicorno : :d.09

bicuspide , curva : :d.19

bifolium : :d.14

biquadriche : :g.02

bocca , curva della : :f.17

Booth , lemniscata di : :d.24

Bowditch , curve di : :h.01

brachistocrona : :i.03

Burnside , curva di : :e.02

C

cardioide: :d.06

Cartesio , folium di : c04 Cartesio , ovali di : :d.08

Alberto Marini

Cartesio , parabola di : c12 Cassini , ovali di : : d.07

catenaria::k.01

catenaria elastica : :k.02

caustica::l.07

Cayley , ovali di : :g.04
Cayley , sestica di : :f.06
Cesaro , alisoide di : :k.09
Ceva , cicloide di : :f.08
Ceva , trisettrice di : :f.18
cicloidali , rullette e curve : :l.02

cicloide::i.01

cicloide di Ceva : :f.08 circonferenza : b04 cissoidale : :l.11

cissoidale di Zahradnik : c17 cissoide di Diocle : c05 clotoidi : G70j09 cocleoide : :k.07

conchiglie di Duerer : :d.15 concoide di de Sluze : c13 concoide di Nicomede : :d.03

 $\begin{array}{l} {\rm concoidi::d.02} \\ {\rm conica\ ,\ sezione:\ b01} \end{array}$

cornoide: :f.07

Cornu , spirali di : :j.09

costante , curva di larghezza : :m.01

 $\begin{array}{l} {\rm cruciforme} \ , \ {\rm curva} \ a : : {\rm d.22} \\ {\rm cubica} \ {\rm di} \ {\rm Lam\'e} : \ c16 \\ \end{array}$

cubica di Tschirnhausen : c10

 ${\rm cubiche}:\,c01$

cuore , sestica : :f.13 $\,$

cuore di Dascanio , curva : :k.15 cuore di Kuriscak , curva : :k.15 cuore di Raphaël Laporte : :g.05 curva a forma di otto : : d.16 curva a punta di pallottola : :d.25 curva anallagmatica : :m.03 curva aplanetica : :d.08 curva atriftotlassica : :f.04 curva autoparallela : :m.01 curva balistica : :k.10 curva bicuspide : :d.19

curva cuore di Dascanio : :k.15 curva cuore di Kuriscak : :k.15

curva cruciforme: :d.22

30

MATeXp – Geometria

curva dei meandri: :k.21 curva del bacio: :f.17 curva del diavolo : :d.13 curva della bocca : :f.17 curva della mascotte : :k.19 curva di Burnside : :e.02 curva di van Gutschoven: :d.11 curva di Jerabek : :d.04 curva di Joukovski: :k.18 curva di larghezza costante : :m.01 curva di risonanza : c02 curva di Talbot : :f.09 curva di Trott : :d.21 curva di Watt::f.16 curva elastica: :k.21 curva generata dal seno : :k.21 curva guida : :l.02 curva isocic
lotomica : :k.20 $\,$ curva kappa: :d.11 curva orbiforme: :m.01 curva ortonomica: :l.08 curva piriforme::k.17 curva rotolante : :l.02 curve cicloidali , rullette e : :l.02 curve di Bowditch::h.01 curve di inseguimento: :m.02 curve di Joseph Plateau: :k.11 curve di Lamé : :h.04 curve di Lissajous : :h.01 curve isottiche: :l.01 curve rodonee::h.02

D

Dascanio , curva cuore di : :k.15
de l'Hopital , quintica di : :e.03
de Longchamps , quartica pera di : :d.17
de Longchamps , trisettrice di : c18
de Sluze , concoide di : c13
de Sluze , perle di : :d.12
deltoide : :d.26
diavolo , curva del : :d.13
Dinostrato , quadratrice di : :k.13
Diocle , cissoide di : c05
diritta , strofoide : c07

Alberto Marini

Duerer , limaccia di : :d.05 Ε elastica , catenaria : :k.02 elastica, curva::k.21 ellisse, evoluta di : :f.14 ${\rm ellisse}:\ b03$ epitrocoide::i.02 equiangolare, spirale: :j.04 equilatero, trifoglio: c18errori , distribuzione normale degli : :k.03 Eudosso , kampile di : :d.10 Eulero , spirale di : :j.09 evoluta : :l.06 evoluta di ellisse : :f.14 evoluta di limaccia di Pascal : :f.15 F farfalla::k.06 farfalla sestica : :f.11 Fermat, spirale di : :j.06 folioide::h.04 ${\rm folium\ di\ Cartesio:}\ c04$ folium doppio::d.14 folium parabolico : c14 Freeth, nefroide di::f.03 G Gerono , lemniscata di : :d.16 guida, curva:: :l.02 van Gutschoven , curva di : :d.11

distribuzione lorentziana : c02

doppio , folium : :d.14 Duerer , conchiglie di : :d.15

distribuzione normale degli errori : :k.03 divergente di Newton , parabola : c08

I

MATeXp-Geometria

inseguimento , curve di : :m.02
inviluppo : :l.05
involuta della circonferenza : :j.08
iperbole : b05
iperbolica , spirale : :j.03
Ippia , quadratrice di : :k.13
Ippia , trisettrice di : :k.13
ippopede di Proclo : :d.24
isociclotomica , curva : :k.20
isottiche , curve : :l.01

J

Jerabek , curva di : :d.04 Joukovski , curva di : :k.18 Juel , quartica di : :d.23

Κ

kampile di Eudosso : :d.10 kappa , curva : :d.11

Kuriscak , curva cuore di : :k.15

L

 $\begin{array}{l} {\rm Lam\'e} \ , \ {\rm curve} \ {\rm di} \ : \ : {\rm h.03} \\ {\rm Lam\'e} \ , \ {\rm cubica} \ {\rm di} \ : \ {\rm \textbf{c16}} \end{array}$

Laporte , cuore di Raphaël : :g.05 larghezza costante , curva : :m.01 lemniscata di Booth : :d.24 lemniscata di Gerono : :d.16

lemniscata di Jacques Bernoulli : :d.27

limaccia di Duerer : :d.05

limaccia di Etienne Pascal : :d.05

Lissajous , curve di : :h.01

lituo : :j.07

$$\label{eq:continuous} \begin{split} & \text{logaritmica , spirale : :j.04} \\ & \text{lorentziana , distribuzione : } \text{c02} \\ & \text{lumaca di Etienne Pascal : :d.05} \end{split}$$

Μ

Alberto Marini

 $\label{eq:macLaurin} \begin{array}{l} \text{MacLaurin , settrice di: :k.20} \\ \text{MacLaurin , trisettrice di: c11} \\ \text{manubrio , sestica: :f.12} \\ \text{mascotte , curva della: :k.19} \\ \text{meandri , curva dei: :k.21} \\ \end{array}$

Ν

nefroide di Freeth : :f.03 Neill , parabola di : c03

Newton , parabola divergente di : c08

Newton , strofoide di : :c.07 Newton , tridente di : :c.12 Nicomede , concoide di : :d.03 Nielsen , spirale di : :j.09

normale degli errori , distribuzione : :k.03

0

ofiuride: :c.15 optoide: :d.08

orbiforme , curva : :m.01 ortocaustica : :1.04

ortonomica , curva : :1.08 ${\rm otto} \ , {\rm curva} \ a \ {\rm forma} \ {\rm di} \ : \ {\rm d.16}$

ovali di Cartesio : :d.08 ovali di Cassini : : d.07 ovali di Cayley : :g.04

Ρ

pallottola , curva a punta di : :d.25

parabola: b02

parabola di Cartesio : :c.12 parabola di Neill : :c.03

parabola divergente di Newton : :c.08

parabola semicubica: :c.03 parabola smorzata: :k.10 parabolico, folium: :c.14

Pascal , evoluta di limaccia di Etienne : :f.15

 $\begin{aligned} & \text{Pascal , limaccia di : :d.05} \\ & \text{Pascal , lumaca di : :d.05} \end{aligned}$

pedale::l.03

MATeXp-Geometria

perle di de Sluze : :d.12 Perseo , spiriche di : :d.28 petali , rosa a 2h+1 petali : :h.02 petali , rosa a 4h : :h.02 petali, rosa a 4 : :f.05 piriforme, curva::k.17 pisello, quartica: :d.18 Plateau , curve di Joseph : :k.11 Plateau , settrice di : :k.20 podaria::l.03 Poinsot , spirali di : :j.12 polare, reciproca: :l.10 Proclo, ippopede di: :d.24 Q quadratrice di Abdank-Abakanowicz : :k.08 quadratrice di Dinostrato : :k.13 quadratrice di Ippia: :k.13 quadrifoglio::f.05 quartica di Juel : :d.23 quartica pera di de Longchamps : :d.17 quartica pisello : :d.18 quartica staffa : :d.20 quartiche: :d.01 quintica di de l'Hopital : :e.03 quintiche: :e.01 R reciproca polare : :l.10 risonanza , curva di : :c.02 rodonee , curve : :h.02 rosa a 2h+1 petali : :h.02 rosa a 4h petali : :h.02

rosa a 4 petali : :f.05 rotolante , curva : :l.02

rulletta::l.02

rullette e curve cicloidali : :l.02

S

scarabeo : :f.10

Alberto Marini

semicubica , parabola : :c.03 seno, curva generata dal seno: :k.21 serpentina: :c.09 sestica , farfalla : :f.11 sestica cuore : :f.13 sestica di Cayley : :f.06 sestica manubrio: :f.12 sestiche::f.01 settiche::g.01 settrice di MacLaurin : :k.20 settrice di Plateau : :k.20 sezioni coniche : b01sezioni spiriche: :d.28 sezioni toriche: :k.14 SiCi , spirale : :j.10 sintrattrice::k.05 sinusoidale , spirale : :j.05 smorzata , parabola : :k.10 spirale di Archimede : :j.02 spirale di Eulero : :j.09 spirale di Fermat : :j.06 spirale di Jacques Bernoulli : :j.04 spirale di Nielsen: :j.09 spirale equiangolare : :j.04 spirale iperbolica : :j.03 spirale logaritmica: :j.04 spirale SiCi : :j.10 spirale sinusoidale : :j.05 spirale trattrice: :j11 spirali: :j.01 spirali di Cornu : :j.09 spirali di Poinsot : :j.12 spiriche, sezioni: :d.28 spiriche di Perseo: :d.28 staffa , quartica : :d.20 strofoide: :c.06 strofoide di Newton: :c.07 strofoide diritta::c.07 superellissi::h.03 Τ Talbot, curva di::f.09

Talbot , curva di : :f.09 tetracuspide : :f.02 toriche , sezioni : :k.14

MATeXp – Geometria

toroidi : :g.03

trattrice ; spirale : :j11 trattrice : :k.04 tricuspide : :d.26

tridente di Newton : :c.12 trifoglio equilatero : :c.18 trisettrice di Ceva : :f.18

trisettrice di de Longchamps : :c.18

trisettrice di Ippia : :k.13 trisettrice di MacLaurin : :c.11

trocoidi: :1.02

Trott , curva di : :d.21

Tschirnhausen , cubica di : :c.10

VWZ

versiera della Agnesi : :c.02 Watt , curva di : :f.16

Zahradnik , cissoidale di : :c.17

L'esposizione in https://www.mi.imati.cnr.it/alberto/ e https://arm.mi.imati.cnr.it/Matexp/matexp_main.php